

# Planche n° 15. Normes matricielles

\* très facile   \*\* facile   \*\*\* difficulté moyenne   \*\*\*\* difficile   \*\*\*\*\* très difficile  
I : Incontournable

## Exercice n° 1 (\*)

On munit  $E = \mathbb{R}[X]$  de la norme  $\|\cdot\|_\infty$  définie par :  $\forall P \in E, \|P\|_\infty = \text{Sup} \left\{ \left| \frac{P^{(n)}(0)}{n!} \right|, n \in \mathbb{N} \right\}$ .

- Vérifier que  $\|\cdot\|_\infty$  est une norme sur  $E$ .
- Soit  $f$  l'endomorphisme de  $E$  défini par  $\forall P \in E, f(P) = XP$ . Démontrer que l'application  $f$  est continue sur  $(E, \|\cdot\|_\infty)$ .

## Exercice n° 2 (\*\*)

On munit  $E = \ell^\infty(\mathbb{C})$  le  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel des suites bornées de la norme  $\|u\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n|$ .

On considère les endomorphismes  $\Delta$  et  $C$  de  $\ell^\infty(\mathbb{C})$  définis par :

$$\forall u \in E, \Delta(u) = v \text{ où } \forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_{n+1} - u_n \text{ et } \forall u \in E, C(u) = w \text{ où } \forall n \in \mathbb{N}, w_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n u_k.$$

Montrer que  $\Delta$  et  $C$  sont continus sur  $(E, \|\cdot\|_\infty)$ .

## Exercice n° 3 (\*\*\*) I

On munit  $E = C^0([0, 1], \mathbb{R})$  de la norme 1 définie par  $\forall f \in E, \|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt$ .

On pose  $T : E \rightarrow E$  et on admet que  $T$  est un endomorphisme de  $E$ .  
 $f \mapsto Tf : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto \int_0^x f(t) dt$

- Démontrer que  $T$  est continu sur  $(E, \|\cdot\|_1)$ .
- Déterminer  $\text{Sup} \left\{ \frac{\|Tf\|}{\|f\|}, f \in E \setminus \{0\} \right\}$  et que cette borne supérieure n'est pas atteinte.

## Exercice n° 4 (\*\*\*) I

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels munis de normes respectivement notées  $\|\cdot\|_E$  et  $\|\cdot\|_F$ . Pour  $f \in \mathcal{L}_c(E, F)$ , on pose  $\|f\| = \text{Sup} \left\{ \frac{\|f(x)\|_F}{\|x\|_E}, x \in E \setminus \{0\} \right\}$ .

- Montrer que  $\|\cdot\|$  est une norme sur  $\mathcal{L}_c(E, F)$ .
- Montrer que  $\forall f \in \mathcal{L}_c(E, F), \|f\| = \text{Sup} \{ \|f(x)\|_F, \|x\|_E = 1 \}$ .
- Montrer que  $\forall (f, g) \in (\mathcal{L}_c(E), \|\cdot\|), \|f \circ g\| \leq \|f\| \times \|g\|$ .
- On suppose de plus que  $\dim(E) < +\infty$ . Montrer que  $\forall f \in \mathcal{L}(E), \|f\| = \text{Max} \{ \|f(x)\|_F, \|x\|_E = 1 \}$ .

## Exercice n° 5 (\*\*\*)

Déterminer  $s = \text{Sup} \left\{ \frac{\|AB\|}{\|A\| \|B\|}, (A, B) \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \setminus \{0\})^2 \right\}$  quand  $\|\cdot\|$  est **1)**  $\|\cdot\|_1$ , **2)**  $\|\cdot\|_2$ , **3)**  $\|\cdot\|_\infty$ .

## Exercice n° 6 (\*\*)

Soit  $N$  une norme sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . Montrer qu'il existe  $k > 0$  tel que  $\forall (A, B) \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))^2, N(AB) \leq k(A)N(B)$ .

## Exercice n° 7 (\*)

Existe-t-il une norme  $N$  sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  ( $n \geq 2$ ) telle que  $\forall (A, B) \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))^2, N(AB) = N(A)N(B)$ .

## Exercice n° 8 (\*\*\*)

On pose  $\forall X = (x_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), \|X\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$  et  $\|X\|_\infty = \text{Max}_{1 \leq i \leq n} |x_i|$ .

Pour  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , déterminer  $\text{Sup} \left\{ \frac{\|AX\|_1}{\|X\|_1}, X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\} \right\}$  et  $\text{Sup} \left\{ \frac{\|AX\|_\infty}{\|X\|_\infty}, X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\} \right\}$ .

**Exercice n° 9 (\*\*I)**

Pour  $X = (x_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ , on pose  $\|X\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ . Pour  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ , on note  $\rho(A)$  le rayon spectral de  $A$  c'est-à-dire  $\rho(A) = \text{Max}\{|\lambda|, \lambda \in \text{Sp}(A)\}$ .

- 1) Montrer que  $\forall A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}), \text{Sup} \left\{ \frac{\|AX\|_2}{\|X\|_2}, X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\} \right\} = \rho(A)$ .
- 2) Pour  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ , on pose  $\|A\| = \rho(A)$ . Montrer que  $\| \cdot \|$  est une norme sur  $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ .