Continuité sur un intervalle

Plan du chapitre

1 Fonctions continues sur un intervalle ..... **page 2**
1.1 Définitions ..... page 2
1.2 Fonctions continues et opérations ..... page 2
2 Les grands théorèmes ..... **page 3**
2.1 Le théorème des valeurs intermédiaires ..... page 3
2.1.1 Compléments sur les intervalles de $\mathbb{R}$ ..... page 3
2.1.2 Le théorème des valeurs intermédiaires ..... page 4
2.2 Image continue d'un segment ..... page 6
3 Fonctions uniformément continues sur un intervalle ..... **page 6**
3.1 Définition et propriétés ..... page 6
3.2 Fonctions lipschitziennes ..... page 9
3.3 Le théorème de Heine ..... page 11
4 Fonctions continues strictement monotones ..... **page 12**

© Jean-Louis Rouget, 2016. Tous droits réservés.

La section 3 de ce chapitre est consacrée aux fonctions uniformément continues sur un intervalle. Ce thème ne doit normalement être abordé qu'au deuxième semestre dans le chapitre « Intégration sur un segment ». Néanmoins, par souci d'unité, nous avons incorporé l'uniforme continuité au chapitre « Continuité ». Vous pouvez sauter cette section si vous le désirez.

1 Fonctions continues sur un intervalle

1.1 Définitions

La définition de la continuité sur un intervalle ou une réunion d'intervalles pose quelques problèmes techniques. On commence par le cas d'un intervalle ouvert.

Définition 1.

1) Soit f une fonction définie sur un intervalle **ouvert** non vide I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

f est **continue** sur I si et seulement si f est continue en chaque point de I.

2) Soit f une fonction définie sur un intervalle I de la forme $[a, b[$ (a réel et b réel ou infini et $a < b$) (resp. $]a, b]$ (b réel et a réel ou infini et $a < b$) à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

f est **continue** sur I si et seulement si f est continue en chaque point de $]a, b[$ et continue à droite en a (resp. continue à gauche en b).

3) Soit f une fonction définie sur un intervalle I de la forme $[a, b]$ (a et b réels et $a < b$) à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

f est **continue** sur I si et seulement si f est continue en chaque point de $]a, b[$, continue à droite en a et continue à gauche en b.

La continuité de f sur I peut s'écrire avec des quantificateurs :

$$f \text{ continue sur } I \Leftrightarrow \forall x_0 \in I,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0 /\ \forall x \in I,\ (|x - x_0| \leqslant \alpha \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| \leqslant \varepsilon).$$

Notation. L'ensemble des fonctions continues sur un intervalle I à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (resp. $\mathbb{C}$) se note $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{C}(I, \mathbb{C})$ ou aussi $C^0(I, \mathbb{R})$ (resp. $C^0(I, \mathbb{C})$) (C^0 (fonctions de classe C^0) est le début d'une liste : C^0, C^1 (fonctions de classe C^1 déjà définies dans le chapitre « Calculs de primitives et d'intégrales » pour les intégrations par parties), C^2, ..., C^∞).

⇨ **Commentaire**. *La définition précédente se généralise sans problème à des sous-ensembles D de $\mathbb{R}$ tels que $D = \mathbb{R}^*$ (qui n'est pas un intervalle) ou $D =]0, 1] \cup [2, +\infty[$. Ici D est une réunion de deux intervalles disjoints et f est continue sur D si et seulement si f est continue sur chacun des deux intervalles.*
Mais il faut se méfier : si $D = I_1 \cup I_2$ où $I_1 = [0, 1[$ et $I_1 = [1, +\infty[$, la continuité sur I_1 et sur I_2 n'assure pas la continuité D car une fonction continue sur I_1 et sur I_2 est continue à droite en 1 mais n'est pas nécessairement continue en 1. Par contre, puisque $D = [0, +\infty[$, une fonction est continue sur D si et seulement si elle est continue en tout point de $]0, +\infty[$ et continue à droite en 0.

1.2 Fonctions continues et opérations

Les théorèmes du chapitre précédent fournissent immédiatement :

Théorème 1. Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1) Pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$, la fonction $\lambda f + \mu g$ est continue sur I.
2) La fonction $f \times g$ est continue sur I.
3) Si de plus la fonction g ne s'annule pas sur I, la fonction $\dfrac{f}{g}$ est continue sur I.

En particulier,

Théorème 2. Soient f une fonctions continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et g une fonction continue sur un intervalle J de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ telles que $f(I) \subset J$.

Si f est continue sur I et g est continue sur J, alors $g \circ f$ est continue sur I.

On rappelle que les fonctions usuelles sont quasiment toutes continues sur le domaine de définition. Plus précisément,

- les fonctions $x \mapsto x^n$, $n \in \mathbb{N}$, sont définies et continues sur $\mathbb{R}$;
- les fonctions $x \mapsto x^n$, $n \in \mathbb{Z}$, sont définies et continues sur $\mathbb{R}^*$;
- les fonctions $x \mapsto \sqrt[n]{x}$, $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, sont définies et continues sur $[0, +\infty[$;
- les fonctions $x \mapsto x^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$, sont définies et continues sur $]0, +\infty[$;

© Jean-Louis Rouget, 2016. Tous droits réservés.

- la fonction $x \mapsto |x|$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$;
- les fonctions $x \mapsto a^x$, $a \in]0,1[\cup]1,+\infty[$, sont définies et continues sur $\mathbb{R}$;
- les fonctions $x \mapsto \log_a(x)$, $a \in]0,1[\cup]1,+\infty[$, sont définies et continues sur $]0,+\infty[$;
- les fonctions $x \mapsto \sin(x)$ et $x \mapsto \cos(x)$ sont définies et continues sur $\mathbb{R}$;
- la fonction $x \mapsto \tan(x)$ est définie et continue sur $\mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$;
- les fonctions $x \mapsto \text{Arcsin}(x)$ et $x \mapsto \text{Arccos}(x)$ sont définies et continues sur $[-1,1]$;
- la fonction $x \mapsto \text{Arctan}(x)$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$;
- les fonctions $x \mapsto \text{sh}(x)$, $x \mapsto \text{ch}(x)$ et $x \mapsto \text{th}(x)$ sont définies et continues sur $\mathbb{R}$.

En ce qui concerne les fonctions $x \mapsto \text{Arcsin}(x)$, $x \mapsto \text{Arccos}(x)$ et $x \mapsto \text{Arctan}(x)$, leurs continuité est une conséquence d'un théorème concernant la réciproque d'une bijection qui sera énoncé et démontré à la fin du chapitre.
En ce qui concerne les fonctions $x \mapsto \text{sh}(x)$, $x \mapsto \text{ch}(x)$ et $x \mapsto \text{th}(x)$, leurs continuité est une conséquence des théorèmes 1 et 2 et de la continuité de la fonction exponentielle (la continuité de la fonction exponentielle étant une conséquence de sa dérivabilité).

Sinon, le théorème 1 permet d'énoncer :

Théorème 3.

- Un polynôme est continu sur $\mathbb{R}$.
- Une fraction rationnelle est continue sur son domaine de définition.

A titre d'exemple d'utilisation de ces « théorèmes généraux », étudions la continuité de la fonction $f : x \mapsto \dfrac{\text{Arcsin}\left(\dfrac{2x}{x^2+1}\right)}{\ln(x^2+1)}$.

- Pour tout réel x, $1+x^2 \neq 0$ puis $1-\left|\dfrac{2x}{x^2+1}\right| = \dfrac{x^2-2|x|+1}{x^2+1} = \dfrac{(|x|-1)^2}{x^2+1} \geqslant 0$ et donc, pour tout réel x, $-1 \leqslant \dfrac{2x}{x^2+1} \leqslant 1$.

La fonction $g_1 : x \mapsto \dfrac{2x}{x^2+1}$ est continue sur $\mathbb{R}$ en tant que fraction rationnelle définie sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $[-1,1]$ et la fonction $g_2 : y \mapsto \text{Arcsin}(y)$ est continue sur $[-1,1]$. Donc, la fonction $g = g_2 \circ g_1 : x \mapsto \text{Arcsin}\left(\dfrac{2x}{x^2+1}\right)$ est continue sur $\mathbb{R}$.

- Pour tout réel x, $1+x^2 > 0$. La fonction $h_1 : x \mapsto x^2+1$ est continue sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $]0,+\infty[$ et la fonction $h_2 : y \mapsto \ln(y)$ est continue sur $]0,+\infty[$. Donc, la fonction $h = h_2 \circ h_1 : x \mapsto \ln\left(x^2+1\right)$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- Pour tout réel x, $1+x^2 > 1$ puis $\ln\left(x^2+1\right) > 0$ et en particulier, pour tout réel x, $h(x) \neq 0$. La fonction $f = \dfrac{g}{h}$ est continue sur $\mathbb{R}$ en tant que quotient de fonctions continues sur $\mathbb{R}$ dont le dénominateur ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$.

2 Les grands théorèmes

2.1 Le théorème des valeurs intermédiaires

2.1.1 Compléments sur les intervalles de $\mathbb{R}$

On rappelle les différents types d'intervalles :

- $[a,b]$, a et b réels tels que $a \leqslant b$ (intervalle fermé borné ou segment)
- $[a,b[$, a et b réels tels que $a < b$ (intervalle semi-ouvert à droite et borné) et $]a,b]$, a et b réels tels que $a < b$ (intervalle semi-ouvert à gauche et borné)
- $]a,b[$, a et b réels tels que $a < b$ (intervalle ouvert et borné)
- $[a,+\infty[$, a réel (intervalle fermé et borné à gauche et non majoré) et $]-\infty,b]$, b réel (intervalle fermé et borné à droite et non minoré)
- $]a,+\infty[$, a réel (intervalle ouvert et borné à gauche et non majoré) et $]-\infty,b]$, b réel (intervalle ouvert et borné à droite et non minoré)
- $]-\infty,+\infty[=\mathbb{R}$.

On a la caractérisation suivante des intervalles :

Théorème 4. Soit I une partie non vide de $\mathbb{R}$.

I est un intervalle si et seulement si $\forall (a,b) \in I^2\ (a \leqslant b \Rightarrow [a,b] \subset I)$.

Démonstration. Il est clair que tout intervalle vérifie la propriété $(*)$: $\forall (a,b) \in I^2\ (a \leqslant b \Rightarrow [a,b] \subset I)$.

Réciproquement, soit I une partie non vide de $\mathbb{R}$ vérifiant $(*)$.

© Jean-Louis Rouget, 2016. Tous droits réservés.

1er cas. On suppose que I est minoré et majoré. I est donc une partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$. On en déduit que I admet une borne inférieure m et une borne supérieure M. Puisque m et M sont respectivement un minorant et un majorant de I, on a $I \subset [m, M]$. On va alors vérifier que I est l'un des quatre intervalles $]m, M[$, $[m, M[$, $m, M]$ ou $[m, M]$.

1er sous-cas. On suppose que $m \in I$ et $M \in I$. On sait déjà que $I \subset [m, M]$. Inversement, puisque m et M sont deux éléments de I vérifiant $m \leqslant M$ et que I vérifie $(*)$, on a $[m, M] \subset I$. Finalement, $I = [m, M]$.

2ème sous-cas. On suppose que $m \in I$ et $M \notin I$. On sait déjà que $I \subset [m, M]$ et même plus précisément $I \subset [m, M[$. Inversement, soit $x_0 \in [m, M[$. Puisque $M = \text{Sup}(I)$, il existe $a \in I$ tel que $x_0 < a < M$. Puisque I vérifie $(*)$, on a $[m, a] \subset I$ et en particulier $x_0 \in I$. Ceci montre que $[m, M[\subset I$ et finalement que $I = [m, M[$.

3ème sous-cas. On suppose que $m \notin I$ et $M \in I$. De manière analogue, on obtient $I =]m, M]$.

4ème sous-cas. On suppose que $m \notin I$ et $M \in I$. On a $I \subset]m, M[$. Inversement, soit $x_0 \in I$. Il existe $(a, b) \in I^2$ tel que $m < a < x_0 < b$. Puisque I vérifie $(*)$, on a $[a, b] \subset I$ et en particulier $x_0 \in I$. Ceci montre que $]m, M[\subset I$ et finalement que $I =]m, M[$.

2ème cas. On suppose que I est minoré et non majoré. I est une partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$. On en déduit que I admet une borne inférieure m. Puisque m est un minorant de I et donc $I \subset [m, +\infty[$.

1er sous-cas. On suppose que $m \in I$. On rappelle que $I \subset [m, +\infty[$. Inversement, soit $x_0 \in I$. Puisque I n'est pas majorée, x_0 n'est pas un majorant de I. Donc, il existe $a \in I$ tel que $a > x_0$. Puisque I vérifie $(*)$, on a $[m, a] \subset I$ et en particulier $x_0 \in I$. Ceci montre que $[m, +\infty[\subset I$ et finalement que $I = [m, +\infty[$.

2ème sous-cas. On suppose que $m \notin I$. On a $I \subset [m, +\infty[$ et même plus précisément $]m, +\infty[\subset I$. Inversement, soit $x_0 \in I$. Comme précédemment, il existe $b \in I$ tel que $b > x_0$ et d'autre part, puisque $m = \text{Inf}(I)$, il existe $a \in I$ tel que $m < a < x_0$. Puisque I vérifie $(*)$, on a $[a, b] \subset I$ et en particulier $x_0 \in I$. Ceci montre que $]m, +\infty[\subset I$ et finalement que $I =]m, +\infty[$.

3ème cas. On suppose que I est non minoré et majoré. De manière analogue, on obtient $I =]-\infty, M]$ ou $I =]-\infty, M[$ où $M = \text{Sup}(I)$.

4ème cas. On suppose que I est non minoré et non majoré. Soit $x_0 \in I$. x_0 n'est ni un minorant, ni un majorant de I. Par suite, il existe $(a, b) \in I^2$ tel que $a < x_0 < b$. Puisque I vérifie $(*)$, on a $[a, b] \subset I$ et en particulier, $x_0 \in I$. Ceci montre que $I =]-\infty, +\infty[$.

❑

⇨ **Commentaire**. *Si* I *est un intervalle et si on pose* $m = \textit{Inf}(I)$ *et* $M = \textit{Sup}(I)$ *où* m *et* M *sont réels ou infinis, alors*

$$]m, M[\subset I \subset [m, M].$$

2.1.2 Le théorème des valeurs intermédiaires

Théorème 5 (théorème des valeurs intermédiaires). Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Si f est continue sur I, alors $f(I)$ est un intervalle.

Démonstration.

1ère démonstration. Posons $J = f(I)$. On va démontrer que $\forall [c, d] \in J^2,\ (c \leqslant d \Rightarrow [c, d] \subset J)$. Soient donc c et d deux éléments de J tels que $c \leqslant d$. Il existe deux réels a et b de I tels que $c = f(a)$ et $d = f(b)$. Quite à remplacer f par $-f$ (qui est continue sur I), on peut supposer que $a \leqslant b$ ce que l'on fait dorénavant. Puisque I est intervalle, on a $[a, b] \subset I$.

Soit $\gamma \in [c, d]$. On va montrer qu'il existe $x_0 \in I$ tel que $f(x_0) = \gamma$. Soit $\mathcal{E} = \{x \in [a, b] / f(x) \leqslant \gamma\}$. Puisque $f(a) = c \leqslant \gamma$, on a $a \in \mathcal{E}$. D'autre part, pour tout $x \in \mathcal{E}$, on a $x \leqslant b$. Ainsi, $\mathcal{E}$ est une partie non vide et majorée (par b) de $\mathbb{R}$. $\mathcal{E}$ admet donc une borne supérieure que l'on note x_0. x_0 est un élément de $[a, b]$ et donc de I. On va montrer que $f(x_0) = \gamma$.

1er cas. Supposons que $x_0 < b$. Puisque x_0 est un majorant de $\mathcal{E}$, si $x \in]x_0, b]$, x n'est pas un élément de $\mathcal{E}$ et donc $f(x) > \gamma$. On fait tendre x vers x_0 par valeurs supérieures. Par continuité de f sur I et donc en x_0, $f(x)$ tend vers $f(x_0)$ quand x tend vers x_0 par valeurs supérieures et on obtient donc $f(x_0) \geqslant \gamma$.

D'autre part, puisque $x_0 = \text{Sup}(\mathcal{E})$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $u_n \in \mathcal{E}$ tel que $|u_n - x_0| \leqslant \dfrac{1}{n}$. Pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$, u_n est un élément de I tel que $f(u_n) \leqslant \gamma$. Puisque pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $|u_n - x_0| \leqslant \dfrac{1}{n}$, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers x_0. Puisque f est continue sur I et en particulier en x_0, la suite $(f(u_n))_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers $f(x_0)$. Puisque pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f(u_n) \leqslant \gamma$, quand n tend vers $+\infty$, on obtient $f(x_0) \leqslant \gamma$ et finalement $f(x_0) = \gamma$.

2ème cas. Supposons que $x_0 = b$. On a déjà $\gamma \leqslant d = f(b) = f(x_0)$. D'autre part, comme dans le premier cas, on peut construire une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ d'éléments de $\mathcal{E}$ convergeant vers $x_0 = b$ et comme précédemment, on obtient $f(x_0) \leqslant \gamma$ puis $f(x_0) = \gamma$.

Dans tous les cas, on a trouvé un élément x_0 de I tel que $f(x_0) = \gamma$. Ainsi, tout γ de $[c, d]$ est un élément de $f(I) = J$ et donc $[c, d] \subset J$. On a montré que $\forall (c, d) \in J^2,\ (c \leqslant d \Rightarrow [c, d] \subset J)$ et donc J est un intervalle.

2ème démonstration (par dichotomie). On reprend les mêmes notations que dans la première démonstration : on se donne deux éléments c et d de J tels que $c \leqslant d$ puis on note a et b deux éléments de I tels que $f(a) = c$ et $f(b) = d$ et on suppose sans perte de généralité que $a \leqslant b$. On se donne enfin $\gamma \in [c, d]$ et on veut montrer que l'équation $f(x) = \gamma$ admet une solution dans I.

Pour $x \in [a, b]$, on pose $g(x) = f(x) - \gamma$ puis on pose $a_0 = a$ et $b_0 = b$. a_0 et b_0 sont deux réels de I tels que $g(a_0) = f(a) - \gamma = c - \gamma \leqslant 0$ et $g(b_0) = f(b) - \gamma = d - \gamma \geqslant 0$.
Si $g\left(\dfrac{a_0 + b_0}{2}\right) \geqslant 0$, on pose $a_1 = a_0$ et $b_1 = \dfrac{a_0 + b_0}{2}$ et si $g\left(\dfrac{a_0 + b_0}{2}\right) < 0$, on pose $a_1 = \dfrac{a_0 + b_0}{2}$ et $b_1 = b_0$. Dans les deux cas, a_1 et b_1 sont deux réels de I tels que $[a_1, b_1]$ est l'une des deux moitiés de l'intervalle $[a_0, b_0]$ et $g(a_1) \leqslant 0$ et $g(b_1) \geqslant 0$.

Soit $n \geqslant 1$. Supposons avoir construit $a_0, \ldots, a_n, b_0, \ldots, b_n$ des réels de I tels que
- $\forall k \in [\![1, n]\!]$, $[a_k, b_k]$ est l'une des deux moitiés de l'intervalle $[a_{k-1}, b_{k-1}]$,
- $\forall k \in [\![0, n]\!]$, $g(a_k) \leqslant 0$ et $g(b_k) \geqslant 0$.

Si $g\left(\dfrac{a_n + b_n}{2}\right) \geqslant 0$, on pose $a_{n+1} = a_n$ et $b_{n+1} = \dfrac{a_n + b_n}{2}$ et si $g\left(\dfrac{a_n + b_n}{2}\right) < 0$, on pose $a_{n+1} = \dfrac{a_n + b_n}{2}$ et $b_{n+1} = b_n$. Dans les deux cas, a_{n+1} et b_{n+1} sont deux réels de I tels que $[a_{n+1}, b_{n+1}]$ est l'une des deux moitiés de l'intervalle $[a_n, b_n]$ et $g(a_{n+1}) \leqslant 0$ et $g(b_{n+1}) \geqslant 0$.

On a ainsi construit par récurrence deux suites $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de I telles que

- $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $[a_n, b_n]$ est l'une des deux moitiés de l'intervalle $[a_{n-1}, b_{n-1}]$,
- $\forall n \in \mathbb{N}$, $g(a_n) \leqslant 0$ et $g(b_n) \geqslant 0$.

Puisque pour tout $n \in \mathbb{N}$, $[a_{n+1}, b_{n+1}]$ est l'une des deux moitiés de l'intervalle $[a_n, b_n]$, on a en particulier $a_n \leqslant a_{n+1} \leqslant b_{n+1} \leqslant b_n$. Les suites $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont donc respectivement croissantes et décroissantes.
D'autre part, puisque pour tout $n \in \mathbb{N}$, $[a_{n+1}, b_{n+1}]$ est l'une des deux moitiés de l'intervalle $[a_n, b_n]$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $b_{n+1} - a_{n+1} = \dfrac{b_n - a_n}{2}$ puis pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $b_n - a_n = \dfrac{b_0 - a_0}{2^n} = \dfrac{b - a}{2^n}$. On en déduit que la suite $(b_n - a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 0.

Les suites $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont donc adjacentes et en particulier convergentes, de même limite. Notons x_0 la limite commune de ces deux suites. Puisque $x_0 \in [a, b]$, x_0 est un élément de I. Puisque g est continue sur I et en particulier en x_0, les suites $(g(a_n))_{n\in\mathbb{N}}$ et $(g(b_n))_{n\in\mathbb{N}}$ convergent vers $g(x_0)$. Puisque pour tout $n \in \mathbb{N}$, $g(a_n) \leqslant 0$ et $g(b_n) \geqslant 0$, quand n tend vers $+\infty$, on obtient $g(x_0) \leqslant 0$ et $g(x_0) \geqslant 0$. Finalement, $g(x_0) = 0$ ou encore $f(x_0) = \gamma$ ce qui achève la démonstration.

❑

⇨ **Commentaire** .

◇ *Le théorème des valeurs intermédiaires se résume parfois en la phrase : « l'image continue d'un intervalle est un intervalle ».*

◇ *Si f est continue sur un intervalle I à valeurs dans $\mathbb{R}$ et si on pose $m = Inf(f(I))$ et $M = Sup(f(I))$ où m et M sont réels ou infinis, alors*

$$]m, M[\subset f(I) \subset [m, M].$$

Le théorème des valeurs intermédiaires a un certain nombre de corollaires intéressants :

Théorème 6. Soit f une fonction continue sur un intervalle I à valeurs dans $\mathbb{R}$.

S'il existe deux réels a et b de I tels que $f(a)f(b) \leqslant 0$, alors f s'annule au moins une fois dans I.

Démonstration . $f(I)$ est un intervalle et donc contient toute valeur comprise entre $f(a)$ et $f(b)$. Puisque $f(a)f(b) \leqslant 0$, 0 est une valeur comprise entre $f(a)$ et $f(b)$ et il existe x compris entre a et b et donc dans I tel que $f(x) = 0$.

❑

Théorème 7. Un polynôme de degré impair à coefficients réels s'annule au moins une fois sur $\mathbb{R}$.

Démonstration . Puisque f est un polynôme de degré impair, ou bien $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$, ou bien $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$. Dans tous les cas, $\text{Inf}(f(\mathbb{R})) = -\infty$ et $\text{Sup}(f(\mathbb{R})) = +\infty$. Puisque f est un polynôme, f est continue sur $\mathbb{R}$ et donc $f(\mathbb{R})$ est un intervalle de $\mathbb{R}$ ou encore

$$f(\mathbb{R}) =]\text{Inf}(f(\mathbb{R})), \text{Sup}(f(\mathbb{R}))[=]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}.$$

En particulier, $0 \in f(\mathbb{R})$ et donc il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $f(x_0) = 0$.

❑

Exercice 1. Soient a et b deux réels tels que $a < b$. Soit f une application de $[a, b]$ dans lui-même, continue sur $[a, b]$.

Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet au moins une solution dans $[a, b]$.

© Jean-Louis Rouget, 2016. Tous droits réservés.

Solution 1. Pour $x \in [a, b]$, posons $g(x) = f(x) - x$.

- g est continue sur $[a, b]$ car f l'est.
- $g(a) = f(a) - a \geqslant 0$ (car $f(a) \in [a, b]$) et $g(b) = f(b) - b \leqslant 0$.

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un réel x_0 de $[a, b]$ tel que $g(x_0) = 0$ ou encore tel que $f(x_0) = x_0$.

2.2 Image continue d'un segment

Théorème 8. Soit f une fonction définie est continue sur un **segment** $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Alors, $f([a, b])$ est un segment de $\mathbb{R}$.

Démonstration. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, $f([a, b])$ est un intervalle I de $\mathbb{R}$.

• Montrons que I est borné. Supposons par l'absurde I non majoré. Alors, pour chaque $n \in \mathbb{N}$, il existe $v_n \in I$ tel que $v_n \geqslant n$. Pour $n \in \mathbb{N}$, il existe $v_n \in [a, b]$ tel que $f(u_n) = v_n$. Puisque pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(u_n) \geqslant n$, on a $\lim\limits_{n \to +\infty} f(u_n) = +\infty$.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'éléments de $[a, b]$ et en particulier, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite réelle bornée. D'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut extraire de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une sous-suite $\left(u_{\varphi(n)}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ convergeant vers un certain réel x_0.

Puisque pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a \leqslant u_{\varphi(n)} \leqslant b$, par passage à la limite quand n tend vers $+\infty$, on obtient $a \leqslant x_0 \leqslant b$. Puisque f est continue sur I, f est continue en x_0.

Puisque la suite $\left(u_{\varphi(n)}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers x_0 et que f est continue en x_0, on a $\lim\limits_{n \to +\infty} f\left(u_{\varphi(n)}\right) = f(x_0)$. Ceci contredit le fait que $\lim\limits_{n \to +\infty} f(u_n) = +\infty$. Il était donc absurde de supposer I non majoré.

On montre de manière analogue que I est minoré.

• I est donc un intervalle borné de $\mathbb{R}$. Posons $m = \text{Inf}(I)$ et $M = \text{Sup}(I)$. m et M sont deux réels tels que

$$]m, M[\subset I \subset [m, M].$$

Montrons que la borne supérieure M de f sur I est atteinte. Puisque $M = \text{Sup}\{f(x),\ x \in [a, b]\}$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $v_n \in I$ tel que $M - \dfrac{1}{n} < v_n < M$. D'après le théorème des gendarmes, la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers M.

Pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $u_n \in [a, b]$ tel quef $(u_n) = v_n$. De nouveau, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'éléments de $[a, b]$ et d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut extraire de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une sous-suite $\left(u_{\varphi(n)}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ convergeant vers un certain réel x_0 de $[a, b]$. Puisque f est continue en x_0, la suite $\left(f\left(u_{\varphi(n)}\right)\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $f(x_0)$. D'autre part, la suite $\left(f\left(u_{\varphi(n)}\right)\right)_{n \in \mathbb{N}}$ est extraite de la suite $(f(u_n))_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers M. On en déduit que la suite $\left(f\left(u_{\varphi(n)}\right)\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge aussi vers M et donc que $f(x_0) = M$. On a montré que M est une valeur atteinte par f.

On montre de même que f atteint sa borne inférieure m et finalement $f([a, b]) = [m, M]$. On a montré que l'image du segment $[a, b]$ par la fonction continue f est un segment de $\mathbb{R}$.

❑

⇨ **Commentaire.** *Le théorème 8 se réénonce parfois sous la forme « l'image continue d'un segment est un segment » ou sous la forme « si f est une fonction continue sur un segment, f est bornée et atteint ses bornes », cette dernière phrase signifiant que f admet un minimum et un maximum.*

3 Fonctions uniformément continues sur un intervalle

3.1 Définition et propriétés

Donnons d'abord la définition avec quantificateurs de la continuité d'une fonction f sur un intervalle I :

$$f \text{ est continue sur } I \Leftrightarrow \forall x_0 \in I,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0 /\ \forall x \in I,\ (|x - x_0| \leqslant \alpha \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| \leqslant \varepsilon).$$

Cette définition traduit la continuité de f en chaque x_0 de I (éventuellement continuité à droite ou à gauche en une éventuelle borne de I comprise). Dans cette définition, le réel α est fonction de ε mais aussi de x_0 et ce réel α peut changer quand x_0 change.

On donne maintenant la définition de l'uniforme continuité de f sur I :

Définition 2. Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

f est **uniformément continue** sur I si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ \forall (x,y) \in I^2,\ (|x-y| \leqslant \alpha \Rightarrow |f(x)-f(y)| \leqslant \varepsilon).$$

Dans cette définition le réel α ne dépend pas de x. Une fonction uniformément continue sur I est continue « de la même façon » en chaque point x de I. En particulier,

Théorème 9. Si f est uniformément continue sur I, **alors** f est continue sur I.

Démonstration .

$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0/\ \forall x \in I,\ \forall y \in I,\ (|x-y| \leqslant \alpha \Rightarrow |f(x)-f(y)| \leqslant \varepsilon) \Rightarrow \forall x \in I, \forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0/\ \forall y \in I,\ (|x-y| \leqslant \alpha \Rightarrow |f(x)-f(y)| \leqslant \varepsilon).$ ❑

La réciproque est fausse. L'exercice suivant fournit un premier exemple de fonction continue qui n'est pas uniformément continue.

Exercice 2.

1) Montrer que la fonction $f\ :\ x \mapsto x^2$ est uniformément continue sur $[0,1]$.

2) Montrer que la fonction $f\ :\ x \mapsto x^2$ n'est pas uniformément continue sur $[0,+\infty[$.

Solution 2.

1) Montrons que : $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0/\ \forall (x,y) \in [0,1]^2,\ \left(|x-y| \leqslant \alpha \Rightarrow \left|x^2-y^2\right| \leqslant \varepsilon\right)$.

Soit $(x,y) \in I^2$. $\left|x^2-y^2\right| = |x-y||x+y| \leqslant 2|x-y|$. Soit alors $\varepsilon > 0$. Soit $\alpha = \dfrac{\varepsilon}{2}$. Si $|x-y| \leqslant \alpha$, alors

$$\left|x^2-y^2\right| \leqslant 2|x-y| \leqslant 2\alpha = 2\frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

On a montré que : $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0/\ \forall (x,y) \in [0,1]^2,\ \left(|x-y| \leqslant \alpha \Rightarrow \left|x^2-y^2\right| \leqslant \varepsilon\right)$. Donc, f est uniformément continue sur $[0,1]$.

2) Montrons que : $\exists \varepsilon > 0,\ \forall \alpha > 0/\ \exists (x_0,y_0) \in [0,+\infty[^2,\ \left(|x_0-y_0| \leqslant \alpha \text{ et } \left|x_0^2-y_0^2\right| > \varepsilon\right)$.

Soit $\varepsilon = 1$. Soit $\alpha > 0$. Soient $x \in [0,+\infty[$ puis $y = x+\alpha$. On a déjà $y \in [0,+\infty[$ et $|x-y| \leqslant \alpha$. D'autre part,

$$|x^2-y^2| = (x+\alpha)^2 - x^2 = 2\alpha x + \alpha^2.$$

On choisit $x_0 = \dfrac{1}{2\alpha}$ (et donc $y_0 = \dfrac{1}{2\alpha} + \alpha$). x_0 et y_0 sont deux réels positifs tels que $|x_0-y_0| \leqslant \alpha$ et

$$\left|x_0^2-y_0^2\right| = 1+\alpha^2 > 1 = \varepsilon.$$

On a montré que $\exists \varepsilon > 0,\ \forall \alpha > 0/\ \exists (x_0,y_0) \in [0,+\infty[^2,\ \left(|x_0-y_0| \leqslant \alpha \text{ et } \left|x_0^2-y_0^2\right| > \varepsilon\right)$. Donc, f n'est pas uniformément continue sur $[0,+\infty[$.

⇨ **Commentaire .** *L'uniforme continuité de la fonction $x \mapsto x^2$ sur $[0,1]$ peut se visualiser. On se donne une « longueur mobile » $\varepsilon > 0$ sur l'axe (Oy) et on fournit une longueur $\alpha > 0$ sur l'axe (Ox) telle que quand x et y sont dans un segment de longueur α contenu dans $[0,1]$, alors x^2 et y^2 sont dans un segment de longueur ε. La courbe étant plus pentue du côté de 1 qu'ailleurs, c'est les valeurs proches de 1 de la variable qui commandent le choix de α.*



Le fait que la fonction $x \mapsto x^2$ ne soit pas uniformément continue sur $[0, +\infty[$ (bien que continue sur $[0, +\infty[$) est moins facile à appréhender. Si x et y sont deux réels distants de α (ou encore si $y = x + \alpha$) l'écart entre les carrés de ces nombres à savoir $(x+\alpha)^2 - x^2 = 2\alpha x + \alpha^2$ n'est pas borné quand x décrit $[0, +\infty[$ et donc ne peut être choisi uniformément sur la totalité de la demi-droite $[Ox)$ de manière à ce que l'écart entre x^2 et $(x+\alpha)^2$ soit uniformément inférieur à ε.



Exercice 3. Montrer que la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est uniformément continue sur $[0, 1]$.

Solution 3. Soit $\varepsilon > 0$. Soient x et y deux réels de $[0, 1]$ tels que $x \leqslant y$.

$$\left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right|^2 = \left(\sqrt{x} - \sqrt{y}\right)^2 = x - 2\sqrt{x \times y} + y \leqslant x - 2\sqrt{x \times x} + y = y - x.$$

En échangeant les rôles de x et y, on obtient pour tout $(x, y) \in [0, 1]^2$, $\left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right|^2 \leqslant |x - y|$ puis $\left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right| \leqslant \sqrt{|x - y|}$.

Soit alors $\alpha = \varepsilon^2$. α est un réel strictement positif tel que, pour $(x, y) \in [0, 1]^2$, si $|x - y| \leqslant \alpha$, alors

$$\left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right| \leqslant \sqrt{\alpha} = \varepsilon.$$

On a montré que : $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0 /\ \forall (x, y) \in [0, 1]^2,\ \left(|x - y| \leqslant \alpha \Rightarrow \left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right| \leqslant \varepsilon\right)$. Donc, la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est uniformément continue sur $[0, 1]$.

Le théorème suivant est un outil efficace pour prouver qu'une fonction n'est pas uniformément continue.

Théorème 10. Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Si il existe deux suites $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de I telles que $x_n - y_n$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$ et $f(x_n) - f(y_n)$ ne tend pas vers 0 quand n tend vers $+\infty$, **alors** f n'est pas uniformément continue sur I.

Démonstration . Montrons la contraposée ou encore montrons que si f est uniformément continue sur I, alors pour toutes suites $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de I telles que $x_n - y_n$ tende vers 0 quand n tend vers $+\infty$, $f(x_n) - f(y_n)$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$.

Soient donc $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites d'éléments de I telles que $x_n - y_n$ tende vers 0 quand n tend vers $+\infty$.

© Jean-Louis Rouget, 2016. Tous droits réservés.

Soit $\varepsilon > 0$. Soit $\alpha > 0$ tel que, pour $(x, y) \in I^2$, $|x - y| \leqslant \alpha \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leqslant \varepsilon$. Puisque la suite $(x_n - y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 0, il existe un rang n_0 tel que, pour $n \geqslant n_0$, $|x_n - y_n| \leqslant \alpha$. Mais alors pour $n \geqslant n_0$, on a $|f(x_n) - f(y_n)| \leqslant \varepsilon$.

On a montré que : $\forall \varepsilon > 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}/\ \forall n \in \mathbb{N}$, $(n \geqslant n_0 \Rightarrow |f(x_n) - f(y_n)| \leqslant \varepsilon)$. Donc, $f(x_n) - f(y_n)$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$.

❑

Exercice 4.

1) Montrer que la fonction $x \mapsto x^2$ n'est pas uniformément continue sur $[0, +\infty[$.

2) Montrer que la fonction $x \mapsto \sin\left(x^2\right)$ n'est pas uniformément continue sur $[0, +\infty[$.

Solution 4.

1) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, posons $x_n = n$ et $y_n = n + \dfrac{1}{n}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, x_n et y_n sont des réels positifs et de plus, la suite $(x_n - y_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge vers 0. Mais

$$|x_n^2 - y_n^2| = \left(n + \frac{1}{n}\right)^2 - n^2 = 2 + \frac{1}{n^2}$$

ne tend pas vers 0 quand n tend vers $+\infty$. Donc la fonction $x \mapsto x^2$ n'est pas uniformément continue sur $[0, +\infty[$.

2) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, posons $x_n = \sqrt{\dfrac{\pi}{2} + 2n\pi}$ et $y_n = \sqrt{\dfrac{\pi}{2} + 2n\pi + \pi}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, x_n et y_n sont des réels positifs et de plus, la suite $(x_n - y_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge vers 0 car

$$|x_n - y_n| = \sqrt{\frac{\pi}{2} + 2n\pi + \pi} - \sqrt{\frac{\pi}{2} + 2n\pi} = \frac{\pi}{\sqrt{\dfrac{\pi}{2} + 2n\pi + \pi} + \sqrt{\dfrac{\pi}{2} + 2n\pi}}.$$

Mais

$$\left|\sin\left(x_n^2\right) - \sin\left(y_n^2\right)\right| = |1 - (-1)| = 2$$

et donc $\left|\sin\left(x_n^2\right) - \sin\left(y_n^2\right)\right|$ ne tend pas vers 0 quand n tend vers $+\infty$. Donc, la fonction $x \mapsto \sin\left(x^2\right)$ n'est pas uniformément continue sur $[0, +\infty[$.

Voici le graphe sur $\mathbb{R}^+$ de la fonction $x \mapsto \sin\left(x^2\right)$ qui est continue sur $[0, +\infty[$ mais non uniformément continue sur $[0, +\infty[$.



3.2 Fonctions lipschitziennes

Définition 3. Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

f est **lipschitzienne** sur I si et seulement si

$$\exists k \in \mathbb{R}^+/\ \forall (x, y) \in I^2,\ |f(x) - f(y)| \leqslant k|x - y|).$$

Si $\forall (x, y) \in I^2$, $|f(x) - f(y)| \leqslant k|x - y|)$, on dit que f est k-lipschitzienne. Le nombre k n'est pas unique car si $\forall (x, y) \in I^2$, $|f(x) - f(y)| \leqslant k|x - y|)$ alors par exemple, $\forall (x, y) \in I^2$, $|f(x) - f(y)| \leqslant (k + 1)|x - y|)$.

Un résultat immédiat est

Théorème 11. f est lipschitzienne sur $I \Leftrightarrow \operatorname{Sup}\left\{\left|\dfrac{f(x) - f(y)}{x - y}\right|,\ (x, y) \in I^2,\ x \neq y\right\} < +\infty$.

© Jean-Louis Rouget, 2016. Tous droits réservés.

Exercice 5.

1) Montrer que la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est lipschitzienne sur $[1, +\infty[$.

2) Montrer que la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas lipschitzienne sur $[0, 1]$.

Solution 5.

1) Soient x et y deux réels de $[1, +\infty[$.

$$\left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right| = \frac{|x-y|}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} \leqslant \frac{|x-y|}{\sqrt{1}+\sqrt{1}} = \frac{1}{2}|x-y|.$$

Donc, la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est $\frac{1}{2}$-lipschitzienne sur $[1, +\infty[$.

2) Soit $M = \text{Sup}\left\{\left|\frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{x-y}\right|,\ (x,y) \in [0,1]^2,\ x \neq y\right\}$. M est un élément de $[0, +\infty]$.

Pour tout $x \in]0, 1]$, $M \geqslant \left|\frac{\sqrt{x}-\sqrt{0}}{x-0}\right| = \frac{1}{\sqrt{x}}$. Quand x tend vers 0 par valeurs supérieures, on obtient $M \geqslant +\infty$. Finalement, $\text{Sup}\left\{\left|\frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{x-y}\right|,\ (x,y) \in [0,1]^2,\ x \neq y\right\} = +\infty$ et donc la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas lipschitzienne sur $[0, 1]$.

⇨ **Commentaire**. *Une fonction lipschitzienne à valeurs dans $\mathbb{R}$ est une fonction dont les valeurs absolues des pentes des cordes de son graphe constituent un ensemble majoré. La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est $\frac{1}{2}$-lipschitzienne sur $[1, +\infty[$: les pentes des cordes à son graphe sont positives et inférieures ou égales à $\frac{1}{2}$ qui est la pente de la tangente à son graphe en son point d'abscisse 1.*



La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas lipschitzienne sur $[0, 1]$ car l'ensemble des pentes des cordes de son graphe n'est pas majoré.



© Jean-Louis Rouget, 2016. Tous droits réservés.

Théorème 12. Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Si f est lipschitzienne sur I, **alors** f est uniformément continue sur I (et en particulier continue sur I).

Démonstration. Supposons f lipschitzienne sur I. Il existe $k \in \mathbb{R}^+$ tel que $\forall (x,y) \in I^2,\ |f(x)-f(y)| \leqslant k|x-y|$. Quite à remplacer k par $k+1$, on peut supposer $k>0$ ce que l'on fait.

Soit $\varepsilon > 0$. Soit $\alpha = \dfrac{\varepsilon}{k}$. Soient x et y deux réels de I tels que $|x-y| \leqslant \alpha$. Alors,

$$|f(x)-f(y)| \leqslant k|x-y| \leqslant k \times \frac{\varepsilon}{k} = \varepsilon.$$

On a montré que : $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0 /\ \forall (x,y) \in I^2,\ (|x-y| \leqslant \alpha \Rightarrow |f(x)-f(y)| \leqslant \varepsilon)$. Donc, f est uniformément continue sur I.

❑

Par exemple, on a vu que la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est $\dfrac{1}{2}$-lipschitzienne sur $[1,+\infty[$. La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est donc uniformément continue sur $[1,+\infty[$.

Citons aussi l'exemple de la fonction $\theta \mapsto e^{i\theta}$. Pour tous réels θ et θ',

$$\begin{aligned}\left|e^{i\theta}-e^{i\theta'}\right| &= \left|e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}}\right|\left|e^{i\frac{\theta-\theta'}{2}}-e^{-i\frac{\theta-\theta'}{2}}\right| = 2\left|\sin\left(\frac{\theta-\theta'}{2}\right)\right| \\ &\leqslant 2\left|\frac{\theta-\theta'}{2}\right| = |\theta-\theta'|.\end{aligned}$$

La fonction $\theta \mapsto e^{i\theta}$ est 1-lipschitzienne sur $\mathbb{R}$ et donc uniformément continue puis continue sur $\mathbb{R}$.

3.3 Le théorème de Heine

Théorème 13 (théorème de Heine). Soit f une fonction définie sur un segment $[a,b]$ $(a<b)$ de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Si f est continue sur $[a,b]$, **alors** f est uniformément continue sur $[a,b]$.

Démonstration. Soit f une fonction continue sur $[a,b]$. Supposons par l'absurde f non uniformément continue sur $[a,b]$. Donc, $\exists \varepsilon > 0 /\ \forall \alpha > 0,\ \exists (x,y) \in [a,b]^2 /\ (|x-y| \leqslant \alpha$ et $|f(x)-f(y)| > \varepsilon)$. ε est ainsi dorénavant fixé.

Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, il existe donc $(x_n,y_n) \in [0,1]^2 /\ |x_n-y_n| \leqslant \dfrac{1}{n+1}$ et $|f(x_n)-f(y_n)| > \varepsilon$.

La suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite réelle bornée. On peut en extraire une sous-suite $\left(x_{\varphi(n)}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ convergeant vers un certain élément x de $[a,b]$. La suite $\left(y_{\varphi(n)}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée en tant que suite extraite d'une suite bornée. On peut en extraire une sous-suite $\left(y_{\psi(n)}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ convergeant vers un certain élément y de $[a,b]$. La suite $\left(x_{\psi(n)}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ est extraite de la suite $\left(x_{\varphi(n)}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ et reste donc convergente de limite x.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $\left|x_{\psi(n)}-y_{\psi(n)}\right| \leqslant \dfrac{1}{\psi(n)+1}$. Quand n tend vers $+\infty$, on obtient $|x-y| \leqslant 0$ et donc $x=y$.

La fonction f est continue sur $[a,b]$ et en particulier, la fonction f est continue en x. Donc, $\lim\limits_{n\to+\infty} f\left(x_{\psi(n)}\right) = f(x)$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} f\left(y_{\psi(n)}\right) = f(y)$. Ensuite, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $\left|f\left(x_{\psi(n)}\right)-f\left(y_{\psi(n)}\right)\right| > \varepsilon$ ce qui fournit par passage à la limite $|f(x)-f(y)| \geqslant \varepsilon > 0$.
En résumé, $x=y$ et $|f(x)-f(y)| > 0$. Ceci est une contradiction et donc f est uniformément continue sur $[a,b]$.

❑

Exercice 6.

1) Montrer que la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est uniformément continue sur $[0,1]$.

2) Montrer que la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est uniformément continue sur $[1,+\infty[$.

2) Montrer que la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est uniformément continue sur $[0,+\infty[$.

Solution 6.

1) La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0,1]$ et donc uniformément continue sur $[0,1]$ d'après le théorème de Heine.

2) Pour tout $(x,y) \in [1,+\infty[^2$,

$$\left|\sqrt{x}-\sqrt{y}\right| = \frac{|x-y|}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} \leqslant \frac{1}{2}|x-y|.$$

La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est lipschitzienne sur $[1, +\infty[$ et donc uniformément continue sur $[1, +\infty[$.

3) Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $\alpha_1 > 0$ tel que pour tout (x, y) de $[0, 1]$, $|x - y| \leqslant \alpha_1 \Rightarrow \left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right| \leqslant \dfrac{\varepsilon}{2}$ et il existe $\alpha_2 > 0$ tel que pour tout (x, y) de $[1, +\infty[$, $|x - y| \leqslant \alpha_2 \Rightarrow \left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right| \leqslant \dfrac{\varepsilon}{2}$.

Soit $\alpha = \text{Min}\{\alpha_1, \alpha_2\} > 0$. Soit $(x, y) \in [0, +\infty[^2$.

- Si $(x, y) \in [0, 1]^2$,

$$|x - y| \leqslant \alpha \Rightarrow |x - y| \leqslant \alpha_1 \Rightarrow \left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right| \leqslant \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow \left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right| \leqslant \varepsilon.$$

- Si $(x, y) \in [1, +\infty[^2$,

$$|x - y| \leqslant \alpha \Rightarrow |x - y| \leqslant \alpha_2 \Rightarrow \left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right| \leqslant \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow \left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right| \leqslant \varepsilon.$$

- Si par exemple $0 \leqslant x \leqslant 1 \leqslant y$, puisque $|x - y| = y - x = (y - 1) + (1 - x) = |y - 1| + |x - 1|$, si $|x - y| \leqslant \alpha$, alors $|x - 1| \leqslant |x - y| \leqslant \alpha \leqslant \alpha_1$ et $|y - 1| \leqslant |x - y| \leqslant \alpha \leqslant \alpha_2$ puis

$$\left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right| \leqslant \left|\sqrt{y} - \sqrt{1}\right| + \left|\sqrt{1} - \sqrt{x}\right| \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Ainsi, pour tout $(x, y) \in [0, +\infty[^2$, si $|x - y| \leqslant \alpha$, alors $\left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right| \leqslant \varepsilon$.

On a montré que : $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0 /\ \forall (x, y) \in [0, +\infty[^2,\ \left(|x - y| \leqslant \alpha \Rightarrow \left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right| \leqslant \varepsilon\right)$. Donc la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est uniformément continue sur $[0, +\infty[$.

---

4 Fonctions continues strictement monotones

Dans ce paragraphe, toutes les fonctions considérées sont définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Rappelons les principaux résultats déjà énoncés et démontrés.

- si f est strictement monotone sur I, alors f est injective.
- si f est continue sur I, alors $f(I)$ est un intervalle.

Si on cumule ces deux résultats, on obtient : si f est continue et strictement monotone sur I, alors f réalise une bijection de I sur $J = f(I)$ qui est un intervalle. On rappelle alors que

- si f est bijective de I sur J et strictement monotone sur I, alors f^{-1} est strictement monotone sur J, de même sens de variation que f.

Vérifions que l'intervalle J est de même nature que l'intervalle I (ouvert, semi-ouvert, fermé). On suppose que f est continue et strictement monotone sur I.

1er cas. On suppose que I est un segment $[a, b]$ (a et b réels tels que $a \leqslant b$). On sait déjà que $f(I) = \left[\underset{x \in I}{\text{Min}} f(x), \underset{x \in I}{\text{Max}} f(x)\right]$. Puisque f est strictement monotone sur I, on a $f([a, b]) = [f(a), f(b)]$ si f est croissante sur I et $f([a, b]) = [f(b), f(a)]$ si f est décroissante sur I. Dans ce cas, J est un intervalle de même nature que I.

2ème cas. On suppose que I est un intervalle semi-ouvert $[a, b[$ (a réel et b réel ou infini tels que $a < b$). Supposons de plus f continue et strictement croissante sur $[a, b[$. On sait que $\forall x \in [a, b[,\ f(a) \leqslant f(x) < \lim\limits_{t \to b} f(t)$. Plus précisément, on sait que $f(a) = \underset{I}{\text{Min}} f$ et que $\lim\limits_{t \to b} f(t) = \underset{I}{\text{Sup}} f$. Donc $f([a, b[) = \left[\underset{I}{\text{Min}} f, \underset{I}{\text{Sup}} f\right[= \left[f(a), \lim\limits_{t \to b} f(t)\right[$.

De même, si f est strictement décroissante sur $[a, b[$, $f([a, b[) = \left]\lim\limits_{t \to b} f(t), f(a)\right]$ et aussi $f(]a, b]) = \left]\lim\limits_{t \to a} f(t), f(b)\right]$ si f est strictement croissante et $f(]a, b]) = \left[f(b), \lim\limits_{t \to a} f(t)\right[$ si f est strictement décroissante.

3ème cas. On suppose que I est un intervalle ouvert $]a, b[$ (a et b réels ou infinis tels que $a < b$). Supposons de plus f continue et strictement croissante sur $[a, b[$. On sait que $\forall x \in [a, b[,\ \lim\limits_{t \to a} f(t) < f(x) < \lim\limits_{t \to b} f(t)$. Plus précisément, on sait que $\lim\limits_{t \to a} f(t) = \underset{I}{\text{Inf}} f$ et que $\lim\limits_{t \to b} f(t) = \underset{I}{\text{Sup}} f$. Donc $f(]a, b[) = \left]\underset{I}{\text{Inf}} f, \underset{I}{\text{Sup}} f\right[= \left]\lim\limits_{t \to a} f(t), \lim\limits_{t \to b} f(t)\right[$.

De même, si f est strictement décroissante sur $]a, b[$, $f(]a, b[) = \left]\lim\limits_{t \to b} f(t), \lim\limits_{t \to a} f(t)\right[$.

© Jean-Louis Rouget, 2016. Tous droits réservés.

On a montré :

Théorème 14. Soit f une fonction définie sur une intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Si f est continue et strictement monotone sur I alors f réalise une bijection de I sur $J = f(I)$ qui est alors un intervalle de même nature que I (ouvert, semi-ouvert, fermé).

On va maintenant établir que la réciproque f^{-1} est continue sur J. On a besoin du lemme suivant :

Théorème 15. Soit f une fonction définie sur une intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, strictement monotone sur I.

f est continue sur I si et seulement si $f(I)$ est un intervalle.

Démonstration . On sait déjà que si f est continue sur l'intervalle I, alors $f(I)$ est un intervalle.

Réciproquement, supposons que $f(I)$ soit un intervalle que l'on note J. Quite à remplacer f par $-f$ (qui est aussi strictement monotone sur I), on supposera que f est strictement croissante sur I.

Soit x_0 un élément de I qui n'est pas une borne de I. Montrons que f est continue en x_0. Puisque f est strictement croissante sur I, on sait que f admet en x_0 des limites à gauche et à droite que l'on note $f\left(x_0^-\right)$ et $f\left(x_0^+\right)$ respectivement ($f\left(x_0^-\right) = \lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ x < x_0}} f(x)$ et $f\left(x_0^+\right) = \lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ x > x_0}} f(x)$) et que $f\left(x_0^-\right) \leqslant f(x_0) \leqslant f\left(x_0^+\right)$.

Supposons par l'absurde f non continue en x_0. Alors, par exemple, $f\left(x_0^-\right) < f(x_0)$ de sorte que l'intervalle $\left]f\left(x_0^-\right), f(x_0)\right[$ n'est pas vide. On sait que pour $x \in I \cap]-\infty, x_0[$, $f(x) \leqslant f\left(x_0^-\right)$ et que pour $x \in I \cap [x_0, +\infty[$, $f(x) \geqslant f(x_0)$. Ainsi, $f(I) \cap \left]-\infty, f\left(x_0^-\right)\right] \neq \varnothing$ et $f(I) \cap [f(x_0), +\infty[\neq \varnothing$ mais $f(I) \cap \left]f\left(x_0^-\right), f(x_0)\right[= \varnothing$ ce qui contredit le fait que $f(I)$ est un intervalle.

❑

On peut maintenant établir :

Théorème 16. Soit f une fonction définie, continue et strictement monotone sur un intervalle I à valeurs dans $\mathbb{R}$.

(f réalise une bijection (encore notée f) de I sur $J = f(I)$ qui est un intervalle de même nature que I et) la réciproque f^{-1} de f est continue sur J.

Démonstration . f^{-1} est strictement monotone sur J et $f^{-1}(J) = I$ est un intervalle de $\mathbb{R}$. D'après le théorème 15, f^{-1} est continue sur J.

❑

⇨ **Commentaire .** *La continuité de la réciproque n'a rien d'anecdotique. En deuxième année, on s'intéressera à la continuité d'une application dans une situation beaucoup plus générale que le cadre des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. La réciproque d'une bijection ne sera alors pas automatiquement continue.*

On peut citer aujourd'hui un exemple de bijection dont la réciproque n'est pas continue. Soit $f : \begin{array}{ccc} [0, 2\pi[& \to & \mathbb{U} \\ \theta & \mapsto & e^{i\theta} \end{array}$. *$f$ est une bijection, continue sur $[0, 2\pi[$ car ses parties réelles et imaginaires le sont. La réciproque de f est* $f^{-1} : \begin{array}{ccc} \mathbb{U} & \to & [0, 2\pi[\\ z & \mapsto & Arg(z) \end{array}$ *où $Arg(z)$ est l'argument de z qui appartient à $[0, 2\pi[$. Maintenant, f^{-1} n'est pas continue en 1 car* $\lim\limits_{\substack{z \to 1 \\ z \in \mathbb{U},\ Im(z) < 0}} f^{-1}(z) = 2\pi \neq 0 = f^{-1}(1)$.

On termine par un résultat plus fin que le résultat : « si f est strictement monotone, alors f est injective ».

Théorème 17. Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle I à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Si f est injective, alors f est strictement monotone.

Démonstration . On montre la contraposée : si f n'est pas strictement monotone sur I, alors f n'est pas injective sur I.

Supposons f non strictement monotone sur I. Il existe donc trois réels x_1, x_2 et x_3 de I tels que $x_1 < x_2 < x_3$ et ou bien $f(x_1) \leqslant f(x_2)$ et $f(x_3) \leqslant f(x_2)$, ou bien $f(x_1) \geqslant f(x_2)$ et $f(x_3) \geqslant f(x_2)$. Quite à remplacer f par $-f$ (qui est continue et non strictement monotone sur I), on peut supposer que $f(x_1) \leqslant f(x_2)$ et $f(x_3) \leqslant f(x_2)$.

Si $f(x_1) = f(x_2)$ ou $f(x_3) = f(x_2)$, f n'est pas injective et c'est fini. Supposons maintenant que $f(x_1) < f(x_2)$ et $f(x_3) < f(x_2)$. Soit γ un réel de l'intervalle $]\text{Max}\{f(x_1), f(x_3)\}, f(x_2)[$ (qui n'est pas vide). Puisque $f(x_1) < \gamma < f(x_2)$ et f est continue sur $[x_1, x_2]$, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $\alpha \in]x_1, x_2[$ tel que $f(\alpha) = \gamma$. De même, il existe $\beta \in]x_2, x_3[$ tel que $f(\beta) = \gamma$.

α et β sont deux réels distincts et éléments de I tels que $f(\alpha) = f(\beta)$. Donc, f n'est pas injective.

Par contraposition, si f est injective et continue sur I, alors f est strictement monotone sur I.

❑

© Jean-Louis Rouget, 2016. Tous droits réservés.