

Logique

Les connecteurs logiques « et » et « ou »

\wedge et \vee sont commutatifs, associatifs et distributifs l'un sur l'autre.
Lois de DE MORGAN : $\overline{P \wedge Q} \Leftrightarrow \overline{P} \vee \overline{Q}$ et $\overline{P \vee Q} \Leftrightarrow \overline{P} \wedge \overline{Q}$.

L'implication et l'équivalence

Si P et Q sont deux propositions, l'implication $P \Rightarrow Q$ est la proposition $\overline{P} \vee Q$.
L'implication $P \Rightarrow Q$ est fausse si et seulement si P est vraie et Q est fausse.

La **négation** de l'implication $P \Rightarrow Q$ est la proposition $P \wedge \overline{Q}$
La **contraposée** de l'implication $P \Rightarrow Q$ est $\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$. Elle est équivalente à $P \Rightarrow Q$.
La **réciproque** de l'implication $P \Rightarrow Q$ est $Q \Rightarrow P$. Elle n'a aucun rapport avec $P \Rightarrow Q$.

$P \Leftrightarrow Q$ est la proposition $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$.
Une équivalence signifie donc deux implications, une de gauche à droite et une de droite à gauche.

Les quantificateurs \forall et \exists

$\overline{(\forall x \in E, P(x))} \Leftrightarrow (\exists x \in E / \overline{P(x)})$ et $\overline{(\exists x \in E, P(x))} \Leftrightarrow (\forall x \in E / \overline{P(x)})$.

On peut permuter des quantificateurs de même nature,
mais on ne peut pas permuter des quantificateurs de nature différente.

On peut distribuer \forall sur « et » et \exists sur « ou »,
mais on ne peut pas distribuer \forall sur « ou » et \exists sur « et ».