

# Planche n° 30. Matrices

\* très facile \*\* facile \*\*\* difficulté moyenne \*\*\*\* difficile  
I : Incontournable T : pour travailler et mémoriser le cours

## Exercice n° 1 : (\*\*T)

Soit  $u$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$  dont la matrice dans la base canonique  $(i, j, k)$  de  $\mathbb{R}^3$  est

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

- 1) Déterminer  $u(2i - 3j + 5k)$ .
- 2) Déterminer  $\text{Ker}u$  et  $\text{Im}u$ .
- 3) Calculer  $M^2$  et  $M^3$ .
- 4) Déterminer  $\text{Ker}u^2$  et  $\text{Im}u^2$ .
- 5) Calculer  $(I - M)(I + M + M^2)$  et en déduire que  $I - M$  est inversible. Préciser  $(I - M)^{-1}$ .

## Exercice n° 2 : (\*\*)

Pour  $x$  réel, on pose

$$A(x) = \begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix}.$$

Déterminer  $(A(x))^n$  pour  $x$  réel et  $n$  entier relatif.

## Exercice n° 3 : (\*\*T)

Soit  $u$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$  dont la matrice dans la base canonique  $(i, j, k)$  de  $\mathbb{R}^3$  est

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{pmatrix}.$$

- 1) Montrer que  $u$  est un automorphisme de  $\mathbb{R}^3$  et déterminer  $u^{-1}$ .
- 2) Déterminer une base  $(e_1, e_2, e_3)$  de  $\mathbb{R}^3$  telle que  $u(e_1) = e_1$ ,  $u(e_2) = e_1 + e_2$  et  $u(e_3) = e_2 + e_3$ .
- 3) Déterminer  $P$  la matrice de passage de  $(i, j, k)$  à  $(e_1, e_2, e_3)$  ainsi que  $P^{-1}$ .
- 4) En déduire  $u^n(i)$ ,  $u^n(j)$  et  $u^n(k)$  pour  $n$  entier relatif.

## Exercice n° 4 : (\*\*)

Soit  $f : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_{n+1}[X]$ .  
 $P \mapsto Q = e^{X^2}(Pe^{-X^2})'$

- 1) Vérifier que  $f \in (\mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X], \mathbb{R}_{n+1}[X]))$ .
- 2) Déterminer la matrice de  $f$  relativement aux bases canoniques de  $\mathbb{R}_n[X]$  et  $\mathbb{R}_{n+1}[X]$ .
- 3) Déterminer  $\text{Ker}f$  et  $\text{rg}f$ .

## Exercice n° 5 : (\*\*I)

Soit  $f$  un endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$ , nilpotent d'indice 2. Montrer qu'il existe une base de  $\mathbb{R}^3$  dans laquelle la matrice de  $f$  s'écrit  $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

**Exercice n° 6 : (\*)**

Soit  $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & & & 1 & 0 \\ \vdots & & & \vdots & \\ 0 & 1 & 0 & & 0 \\ 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ . Calculer  $A^n$  pour  $n$  entier relatif.

**Exercice n° 7 : (\*\*)**

Montrer que  $\left\{ \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & 1 \end{pmatrix}, x \in ]-1, 1[ \right\}$  est un groupe pour la multiplication des matrices.

**Exercice n° 8 : (\*\*\*)**

1) Montrer qu'une matrice triangulaire supérieure est inversible si et seulement si ses coefficients diagonaux sont tous non nuls.

2) Montrer que toute matrice triangulaire supérieure est semblable à une matrice triangulaire inférieure.

**Exercice n° 9 : (\*\*\*)**

Soient  $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  et  $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  puis  $E = \{M(x, y) = xI + yJ, (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$ .

1) Montrer que  $(E, +, \cdot)$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ . Déterminer une base de  $E$  et sa dimension.

2) Montrer que  $(E, +, \times)$  est un anneau commutatif.

3) Quels sont les inversibles de cet anneau ?

4) Résoudre dans  $E$  les équations suivantes :

$$\text{a) } X^2 = I \quad \text{b) } X^2 = 0 \quad \text{c) } X^2 = X.$$

5) Calculer  $(M(x, y))^n$  pour  $n$  entier naturel non nul.

**Exercice n° 10 : (\*\*\*)**

Soient  $A \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$  et  $B \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$  telles que

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Montrer l'existence d'au moins un couple  $(A, B)$  vérifiant les conditions de l'énoncé puis calculer  $BA$ . (Indication. Calculer  $(AB)^2$  et utiliser le rang.)

**Exercice n° 11 : (\*\*\*)**

Soit  $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$  ( $n \geq 2$ ) définie par

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{i,j} = \begin{cases} i & \text{si } i = j \\ 1 & \text{si } i > j \\ 0 & \text{si } i < j \end{cases}.$$

Montrer que  $A$  est inversible et calculer son inverse.

**Exercice n° 12 : (\*\*\*)**

Déterminer l'ensemble des éléments de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  qui commutent avec tous les éléments de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  (utiliser les matrices élémentaires).

**Exercice n° 13 : (\*\*\*)**

Déterminer le rang des matrices suivantes :

$$\begin{array}{lll}
1) \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ 1/3 & 1/4 & m \end{pmatrix} & 2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b+c & c+a & a+b \\ bc & ca & ab \end{pmatrix} & 3) \begin{pmatrix} 1 & a & 1 & b \\ a & 1 & b & 1 \\ 1 & b & 1 & a \\ b & 1 & a & 1 \\ a & b & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & \ddots & \ddots & b \\ b & 0 & \dots & 0 & a \end{pmatrix}, (a, b) \in \mathbb{C}^2. \\
4) (i+j+ij)_{1 \leq i, j \leq n} & 5) (\sin(i+j))_{1 \leq i, j \leq n} & 6)
\end{array}$$

**Exercice n° 14 : (\*\*\*\*)**

Montrer que tout hyperplan de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  ( $n \geq 2$ ) contient au moins une matrice inversible.

**Exercice n° 15 : (\*\*\*I)** (Théorème de HADAMARD).

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  telle que :  $\forall i \in [1, n], |a_{i,i}| > \sum_{j \neq i} |a_{i,j}|$ . Montrer que  $A$  est inversible.

**Exercice n° 16 : (\*\*\*I)** (Matrice de VANDERMONDE des racines  $n$ -ièmes de l'unité).

Soit  $\omega = e^{2i\pi/n}$ , ( $n \geq 2$ ). Soit  $A = (\omega^{(j-1)(k-1)})_{1 \leq j, k \leq n}$ . Montrer que  $A$  est inversible et calculer  $A^{-1}$  (calculer d'abord  $A\bar{A}$ ).

**Exercice n° 17 : (\*\*\*I)**

Soit  $A = (a_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n+1}$  définie par  $a_{i,j} = 0$  si  $i > j$  et  $a_{i,j} = \binom{i-1}{j-1}$  si  $i \leq j$ .

Montrer que  $A$  est inversible et déterminer son inverse. (Indication : considérer l'endomorphisme de  $\mathbb{R}_n[X]$  qui à un polynôme  $P$  associe le polynôme  $P(X+1)$ ).

**Exercice n° 18 : (\*\*I)**

On pose  $u_0 = 1, v_0 = 0$ , puis, pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = 2u_n + v_n$  et  $v_{n+1} = u_n + 2v_n$ .

1) Soit  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ . Pour  $n \in \mathbb{N}$ , calculer  $A^n$ . En déduire  $u_n$  et  $v_n$  en fonction de  $n$ .

2) En utilisant deux combinaisons linéaires intéressantes des suites  $u$  et  $v$ , calculer directement  $u_n$  et  $v_n$  en fonction de  $n$ .

**Exercice n° 19 : (\*\*)**

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  puis  $B$  l'élément de  $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{C})$  défini par  $B = \begin{pmatrix} A & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & A \end{pmatrix}$ . Déterminer le rang de  $B$  en fonction du rang de  $A$ .