

Exercices d'oraux de la banque CCP 2014-2015

20 exercices sur les 37 d'algèbre peuvent être traités en Maths Sup.

BANQUE ALGÈBRE

EXERCICE 59

Soit E l'espace vectoriel des polynômes à coefficients dans \mathbb{K} ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) de degré inférieur ou égal à n . Soit f l'endomorphisme de E défini par : $\forall P \in E, f(P) = P - P'$.

1) Démontrer que f est bijectif de deux manières :

(a) sans utiliser la matrice de f ,

(b) en utilisant la matrice de f .

2) Soit $Q \in E$. Trouver P tel que $f(P) = Q$.

Indication : si $P \in E$, quel est le polynôme $P^{(n+1)}$?

EXERCICE 60

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ et f l'endomorphisme de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ défini par : $f(M) = AM$.

1) Déterminer $\text{Ker}(f)$.

2) f est-il surjectif ?

3) Trouver une base de $\text{Ker}(f)$ et une base de $\text{Im}(f)$.

EXERCICE 62

Soit E un espace vectoriel sur \mathbb{R} ou \mathbb{C} .

Soient f et g deux endomorphismes de E tels que $f \circ g = \text{Id}$.

1) Démontrer que $\text{Ker}(g \circ f) = \text{Ker}(f)$.

2) Démontrer que $\text{Im}(g \circ f) = \text{Im}(g)$.

3) Démontrer que $E = \text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(g)$.

EXERCICE 64

Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension n .

1) Démontrer que $E = \text{Im}f \oplus \text{Ker}f \Rightarrow \text{Im}f = \text{Im}f^2$.

2) (a) Démontrer que $\text{Im}f = \text{Im}f^2 \Leftrightarrow \text{Ker}f = \text{Ker}f^2$.

(b) Démontrer que $\text{Im}f = \text{Im}f^2 \Rightarrow E = \text{Im}f \oplus \text{Ker}f$.

EXERCICE 71

Soit p la projection vectorielle de \mathbb{R}^3 , sur le plan P d'équation $x + y + z = 0$, parallèlement à la droite D d'équation $x = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$.

1) Vérifier que $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$.

2) Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

Déterminer $p(u)$ et donner la matrice de p dans la base canonique de \mathbb{R}^3 .

3) Déterminer une base de \mathbb{R}^3 dans laquelle la matrice de p est diagonale.

EXERCICE 76

Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel muni d'un produit scalaire (\mid) .

On pose $\forall x \in E, \|x\| = \sqrt{(x\mid x)}$.

1) (a) Énoncer et démontrer l'inégalité de CAUCHY-SCHWARZ.

(b) Dans quel cas a-t-on l'égalité? Le démontrer.

2) Soit $E = \{f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}), \forall x \in [a, b], f(x) > 0\}$.

Prouver que l'ensemble $\left\{ \int_a^b f(t) dt \times \int_a^b \frac{1}{f(t)} dt, f \in E \right\}$ admet une borne inférieure m et déterminer la valeur de m .

EXERCICE 77

Soit E un espace euclidien.

1) Soit A un sous-espace vectoriel de E .

Démontrer que $(A^\perp)^\perp = A$.

2) Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

(a) Démontrer que $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$.

(b) Démontrer que $(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp$.

EXERCICE 78

Soit E un espace euclidien de dimension n et u un endomorphisme de E .

On note $(x \mid y)$ le produit scalaire de x et y et $\| \cdot \|$ la norme euclidienne associée.

1) Soit u un endomorphisme de E tel que $\forall x \in E, \|u(x)\| = \|x\|$.

(a) Démontrer que $\forall (x, y) \in E^2, (u(x) \mid u(y)) = (x \mid y)$.

(b) Démontrer que u est bijectif.

2) Démontrer que l'ensemble $\mathcal{O}(E)$ des isométries vectorielles de E , muni de la loi \circ , est un groupe.

3) Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Soit $e = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E .

Prouver que $u \in \mathcal{O}(E) \iff (u(e_1), u(e_2), \dots, u(e_n))$ est une base orthonormée de E .

EXERCICE 79

Soit a et b deux réels tels que $a < b$.

1) Soit h une fonction continue et positive de $[a, b]$ dans \mathbb{R} .

Démontrer que $\int_a^b h(x) dx = 0 \implies h = 0$.

2) Soit E le \mathbb{R} -espace vectoriel des fonctions continues de $[a, b]$ dans \mathbb{R} .

On pose $\forall (f, g) \in E^2, (f \mid g) = \int_a^b f(x)g(x) dx$.

Démontrer que l'on définit ainsi un produit scalaire sur E .

3) Majorer $\int_0^1 \sqrt{x}e^{-x} dx$ en utilisant l'inégalité de CAUCHY-SCHWARZ.

EXERCICE 80

Soit E l'espace vectoriel des applications continues et 2π -périodiques de \mathbb{R} dans \mathbb{R} .

- 1) Démontrer que $(f | g) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t)g(t) dt$ définit un produit scalaire sur E .
- 2) Soit F le sous-espace vectoriel engendré par $f : x \mapsto \cos x$ et $g : x \mapsto \cos(2x)$. Déterminer le projeté orthogonal sur F de la fonction $u : x \mapsto \sin^2 x$.

EXERCICE 81

On définit dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ l'application $\varphi(A, A') = \text{Tr}({}^tAA')$ où $\text{Tr}({}^tAA')$ désigne la trace du produit de la matrice tA par la matrice A' .

On note $\mathcal{F} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}, (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$.

On admet que φ est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

- 1) Démontrer que \mathcal{F} est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
- 2) Déterminer une base de \mathcal{F}^\perp .
- 3) Déterminer la projection orthogonale de $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ sur \mathcal{F}^\perp .
- 4) Calculer la distance de J à F .

EXERCICE 82

Soit E un espace préhilbertien et F un sous-espace vectoriel de E de dimension finie $n > 0$.

On admet que pour tout $x \in E$, il existe un élément unique y_0 de F tel que $x - y_0$ soit orthogonal à F et que la distance de x à F soit égale à $\|x - y_0\|$.

Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $A' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$, on pose $(A|A') = aa' + bb' + cc' + dd'$.

- 1) Démontrer que $(. | .)$ est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
- 2) Calculez la distance de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ au sous-espace vectoriel des matrices triangulaires supérieures.

EXERCICE 84

- 1) Donner la définition d'un argument d'un nombre complexe non nul (on ne demande ni l'interprétation géométrique, ni la démonstration de l'existence d'un tel nombre).
- 2) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Donner, en justifiant, les solutions dans \mathbb{C} les solutions de l'équation $z^n = 1$ et préciser leur nombre.
- 3) En déduire, pour $n \in \mathbb{N}^*$, les solutions dans \mathbb{C} de l'équation $(z + i)^n = (z - i)^n$ et démontrer que ce sont des nombres réels.

EXERCICE 85

- 1) Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $P \in \mathbb{R}_n[X]$ et $a \in \mathbb{R}$.
 - (a) Donner sans démonstration, en utilisant la formule de TAYLOR, la décomposition de $P(x)$ dans la base $(1, X - a, (X - a)^2, \dots, (X - a)^n)$.
 - (b) Soit $r \in \mathbb{N}^*$. En déduire que :
 a est une racine de P d'ordre de multiplicité r si et seulement si $P^{(r)}(a) \neq 0$ et $\forall k \in \llbracket 0, r - 1 \rrbracket$, $P^{(k)}(a) = 0$.
- 2) Déterminer deux réels a et b pour que 1 soit racine double du polynôme $P = X^5 + aX^2 + bX$ et factoriser alors ce polynôme dans $\mathbb{R}[X]$.

EXERCICE 86

Soit p un nombre premier.

1) (a) Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$. Prouver que si $p \wedge a = 1$ et $p \wedge b = 1$, alors $p \wedge (ab) = 1$.

(b) Prouver que $\forall k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$, p divise $\binom{p}{k} k!$ puis que p divise $\binom{p}{k}$.

2) (a) Prouver que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $n^p \equiv n \pmod{p}$.

Indication : procéder par récurrence.

(b) En déduire que : $\forall n \in \mathbb{N}$, p ne divise pas $n \implies n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

EXERCICE 87

Soient a_0, a_1, \dots, a_n $n+1$ réels deux à deux distincts.

1) Montrer que si b_0, b_1, \dots, b_n sont $n+1$ réels quelconques, alors il existe un unique polynôme P vérifiant

$$\deg(P) \leq n \quad \text{et} \quad \forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(a_i) = b_i.$$

2) Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

Expliciter ce polynôme P , que l'on notera L_k lorsque :

$$\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, b_i = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq k \\ 1 & \text{si } i = k \end{cases}.$$

3) Prouver que $\forall p \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\sum_{k=0}^p a_k^p L_k = X^p$.

EXERCICE 88

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit le polynôme $P = aX^{n+1} + bX^n + 1$.

1) Déterminer a et b pour que 1 soit racine d'ordre au moins 2 de P .

2) Dans ce cas, vérifier que le quotient de la division euclidienne de P par $(X-1)^2$ est $\sum_{k=0}^{n-1} (k+1)X^k$.

EXERCICE 89

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$. On pose $z = e^{i \frac{2\pi}{n}}$.

1) On suppose $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$.

Déterminer le module et un argument du complexe $z^k - 1$.

2) On pose $S = \sum_{k=0}^{n-1} |z^k - 1|$. Montrer que $S = \frac{2}{\tan \frac{\pi}{2n}}$.

EXERCICE 90

\mathbb{K} désigne le corps des réels ou celui des complexes.

Soient a_1, a_2, a_3 trois scalaires distincts donnés de \mathbb{K} .

1) Montrer que $\Phi : \mathbb{K}_2[X] \longrightarrow \mathbb{K}^3$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels.
$$P \longmapsto (P(a_1), P(a_2), P(a_3))$$

2) On note (e_1, e_2, e_3) la base canonique de \mathbb{K}^3 et on pose $\forall k \in \{1, 2, 3\}$, $L_k = \Phi^{-1}(e_k)$.

(a) Justifier que (L_1, L_2, L_3) est une base $\mathbb{K}_2[X]$.

(b) Exprimer les polynômes L_1, L_2 et L_3 en fonction de a_1, a_2 et a_3 .

3) Soit $P \in \mathbb{K}_2[X]$. Déterminer les coordonnées de P dans la base (L_1, L_2, L_3) .

4) *Application* :

on se place dans \mathbb{R}^2 muni d'un repère orthonormé et on considère les trois points $A(0, 1)$, $B(1, 3)$, $C(2, 1)$.
Déterminer une fonction polynomiale de degré 2 dont la courbe passe par les points A , B et C .

EXERCICE 95

1) Énoncer le théorème de BÉZOUT dans \mathbb{Z} .

2) Soit a et b deux entiers naturels premiers entre eux. Soit $c \in \mathbb{N}$.
Prouver que : $(a \mid c \text{ et } b \mid c) \iff ab \mid c$.

3) On considère le système (S) : $\begin{cases} x \equiv 6 \pmod{17} \\ x \equiv 4 \pmod{15} \end{cases}$ dans lequel l'inconnue x appartient à \mathbb{Z} .

(a) Déterminer une solution particulière x_0 de (S) dans \mathbb{Z} .

(b) *Déduire des questions précédentes* la résolution dans \mathbb{Z} du système (S).