


Interprétation géométrique des nombres complexes


Affixe d'un point, affixe d'un vecteur. Image ponctuelle, image vectorielle d'un nombre complexe



Si M est le point de coordonnées (x, y) , l'affixe de M est le nombre $z_M = x + iy$.
 Si \vec{u} est le vecteur de coordonnées (x, y) , l'affixe de \vec{u} est le nombre $z_{\vec{u}} = x + iy$.
 Si $z = x + iy$ où x et y sont deux réels alors

- l'image ponctuelle de z est le point $M(x, y)$
- l'image vectorielle de z est le vecteur $\vec{u}(x, y)$


Opposé, conjugué d'un nombre complexe



Le point M_2 d'affixe \bar{z} est le **symétrique par rapport à (Ox)** du point M_1 d'affixe z .
 Le point M_3 d'affixe $-z$ est le **symétrique par rapport à O** du point M_1 d'affixe z .
 Le point M_4 d'affixe $-\bar{z}$ est le **symétrique par rapport à (Oy)** du point M_1 d'affixe z .


Opérations dans \mathbb{C}

Différence de complexes




La différence de deux complexes est l'affixe d'un vecteur.
 $z_{\vec{AB}} = z_B - z_A$.

Somme de complexes




La somme de deux complexes est l'affixe de la somme de deux vecteurs.
 $z_{\vec{u} + \vec{u}'} = z_{\vec{u}} + z_{\vec{u}'}$.

Multiplication par un complexe de module 1




Multiplier z par le complexe $e^{i\theta}$ de module 1 équivaut à faire tourner $M(z)$ d'un angle θ autour de O .

Multiplication par un complexe non nul



Multiplier z par le complexe $re^{i\theta}$ ($r > 0$) équivaut à faire tourner $M(z)$ d'un angle θ autour de O puis à construire l'image du point obtenu par l'homothétie de centre O et de rapport r .

Multiplication d'un vecteur par un réel. Colinéarité de deux vecteurs




Si λ est un nombre réel,

$$z_{\lambda \vec{u}} = \lambda z_{\vec{u}}$$

Milieux. Barycentres

- Soient A et B deux points et I le milieu du segment [AB]. $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$.
- Soient A, B, ... des points du plan et a, b, ... des réels tels que $a + b + \dots \neq 0$.
Si $G = \text{bar}\{A(a), B(b), \dots\}$ alors $z_G = \frac{az_A + bz_B + \dots}{a + b + \dots}$.

Module d'un nombre complexe



- x et y sont deux réels, $M(x, y)$ et $z = z_M = x + iy$.

$$|z| = OM = \|\vec{OM}\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$


- $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$, $z_A = x_A + iy_A$ et $z_B = x_B + iy_B$.

$$AB = \|\vec{AB}\| = |z_B - z_A| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

- A, B, C et D sont quatre points d'affixes respectives a, b, c et d ($b \neq a$).

$$\left| \frac{d - c}{b - a} \right| = \frac{CD}{AB}.$$

Argument d'un nombre complexe non nul. Forme trigonométrique. Coordonnées polaires



- Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct (O, \vec{u}, \vec{v}) .

M est un point distinct de O d'affixe $z \neq 0$.

$$\arg(z) = (\vec{u}, \vec{OM}) \quad (2\pi).$$

- A, B, C et D sont quatre points tels que $B \neq A$ et $D \neq C$, d'affixes respectives a, b, c et d.

$$\arg\left(\frac{d - c}{b - a}\right) = (\vec{AB}, \vec{CD}) \quad (2\pi).$$

- M est un point distinct de O d'affixe $z \neq 0$.

Les phrases suivantes sont équivalentes :

① $z = re^{i\theta}$, r réel strictement positif, θ réel.

② $r = |z|$ et $\theta = \arg(z) \quad (2\pi)$.

③ Un couple de coordonnées polaires de M est $[r, \theta]$.

④ $r = OM$ et $\theta = (\vec{u}, \vec{OM}) \quad (2\pi)$.