

BACCALAUREAT GENERAL

Session 2005

MATHEMATIQUES

Série S

ENSEIGNEMENT de SPECIALITE

Durée de l'épreuve : 4 heures

Coefficient : 9

Les calculatrices électroniques de poche sont autorisées,
conformément à la réglementation en vigueur.

Du papier millimétré est mis à la disposition du candidat.

Le sujet est composé de 4 exercices indépendants. Le candidat doit traiter tous les exercices. Dans chaque exercice, le candidat peut admettre un résultat précédemment donné dans le texte pour aborder les questions suivantes, à condition de l'indiquer clairement sur la copie. La qualité et la précision de la rédaction seront prises en compte dans l'appréciation des copies.

Avant de composer, le candidat s'assurera que le sujet comporte bien 5 pages numérotées de 1 à 5.

EXERCICE 1 (4 points)

Commun à tous les candidats

Pour chacune des huit affirmations (entre guillemets) ci-dessous, préciser si elle est vraie ou fausse. **Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la mention « vrai » ou « faux ».** Une réponse correcte rapporte 0,5 point, une réponse incorrecte enlève 0,25 point, l'absence de réponse n'apporte ni n'enlève aucun point. Un éventuel total négatif sera ramené à 0.

1) « Si a est un nombre réel quelconque et f est une fonction définie et strictement décroissante sur $[a; +\infty[$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$. »

2) Soient f et g deux fonctions définies sur $[0; +\infty[$, g ne s'annulant pas :

$$\text{« Si } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \text{ et si } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty \text{ alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = -1. \text{ »}$$

3) « Si f est une fonction définie sur $[0; +\infty[$ telle que $0 \leq f(x) \leq \sqrt{x}$ sur $[0; +\infty[$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$. »

4) On considère un repère (O, \vec{i}, \vec{j}) du plan.
« Si f est une fonction définie sur \mathbb{R}^* alors la droite d'équation $x = 0$ est asymptote à la courbe représentative de f dans le repère (O, \vec{i}, \vec{j}) . »

5) « La fonction f définie par $f(x) = (x^2 + 3x + 1)e^x$ est une solution sur \mathbb{R} de l'équation différentielle $y' - y = (2x + 3)e^x$. »

6) Soient A, B, C trois points du plan. On appelle I le barycentre des points A et B affectés respectivement des coefficients 3 et -2 .
« Si G est le barycentre des points A, B et C affectés respectivement des coefficients 3, -2 et 1 alors G est le milieu du segment $[CI]$. »

7) Soient A, B, C trois points du plan et G le barycentre de A, B et C affectés respectivement des coefficients 3, -2 et 1.
« L'ensemble des points M du plan tels que $\|3\vec{MA} - 2\vec{MB} + \vec{MC}\| = 1$ est le cercle de centre G et de rayon 1. »

8) Soient A et B deux points distincts du plan. On désigne par M un point quelconque du plan.
« Le produit scalaire $\vec{MA} \cdot \vec{MB}$ est nul si et seulement si $M = A$ ou $M = B$. »

EXERCICE 2 (3 points)

Commun à tous les candidats

Un fabricant d'écrans plasma teste une première fois ses appareils à la sortie de la chaîne de fabrication.

Si le test est positif (c'est-à-dire si l'écran fonctionne correctement), l'écran est acheminé chez le client. Sinon l'écran retourne en usine où il est réparé puis testé une seconde fois. Si ce deuxième test est positif, l'écran est acheminé chez le client, sinon il est détruit.

Une étude statistique a permis de montrer que le test est positif pour 70% des écrans neufs sortis directement des chaînes de fabrication. mais que parmi les écrans réparés, seulement 65% d'entre eux passent le second test avec succès.

On note T_1 l'événement : « le premier test est positif ».

On note C l'événement : « l'écran est acheminé chez le client ».

1) On choisit un écran au hasard à la sortie de la chaîne de fabrication.

Déterminer les probabilités des événements T_1 et C .

2) La fabrication d'un écran revient à 1000 € au fabricant si l'écran n'est testé qu'une fois.

Cela lui coûte 50 € de plus si l'écran doit être testé une seconde fois.

Un écran est facturé a euros (a étant un réel positif) au client.

On introduit la variable aléatoire X qui, à chaque écran fabriqué, associe le « gain » (éventuellement négatif) réalisé par le fabricant.

a) Déterminer la loi de probabilité de X en fonction de a .

b) Exprimer l'espérance de X en fonction de a .

c) A partir de quelle valeur de a , l'entreprise peut-elle espérer réaliser des bénéfices ?

EXERCICE 3 (8 points)

Commun à tous les candidats

Partie A

On considère la suite (u_n) définie par :

$$\text{pour tout entier naturel } n \text{ non nul, } u_n = \int_0^1 (1-t)^n e^t dt.$$

1) Montrer que la fonction $f : t \mapsto (2-t)e^t$ est une primitive de $g : t \mapsto (1-t)e^t$ sur $[0; 1]$. En déduire la valeur de u_1 .

2) Montrer à l'aide d'une intégration par parties que, pour tout n non nul,

$$u_{n+1} = (n+1)u_n - 1 \quad (R).$$

Partie B

1) On regarde d'abord ce qu'affichent deux calculatrices différentes pour les valeurs approchées des 25 premiers termes de la suite (u_n) en utilisant pour le calcul la relation de récurrence (R) ci-dessus.

Voici les résultats affichés par ces deux calculatrices :

Valeur de n	Valeur de u_n affichée par la première calculatrice	Valeur de u_n affichée par la deuxième calculatrice
1	7,188182845E-01	7,1828182846E-01
2	4,3656365691E-01	4,3656365692E-01
3	3,09690907075E-01	3,0969097076E-01
4	2,3876388301E-01	2,3876388304E-01
5	1,9381941508E-01	1,9381941520E-01
6	1,6291649051E-01	1,6291649120E-01
7	1,4041543358E-01	1,4041543840E-01
8	1,2332346869E-01	1,2332350720E-01
9	1,0991121828E-01	1,0991156480E-01
10	9,9112182825E-02	9,115648000E-02
11	9,0234011080E-02	9,0272128000E-02
12	8,2808132963E-02	8,3265536000E-02
13	7,6505728522E-02	8,2451968000E-02
14	7,1080199309E-02	1,5432755200E-01
15	6,6202989636E-02	1,3149132800E+00
16	5,9247834186E-02	2,0038612480E+01
17	7,2131811612E-03	3,3965641216E+02
18	-8,7016273909E-01	6,1128154189E+03
19	-1,7533092042E+01	1,1614249296E+05
20	-3,5166184085E+02	2,3228488592E+06
21	-7,3858986580E+03	4,8779825043E+07
22	-1,6249077047E+05	1,0731561499E+09
23	-3,7372887209E+06	2,4682591448E+10
24	-8,9694930302E+07	5,9238219474E+11
25	-2,2423732585E+09	1,4809554869E+13

Quelle conjecture peut-on faire sur la convergence de la suite (u_n) quand on examine les résultats obtenus avec la première calculatrice ? Et avec les résultats obtenus avec la deuxième calculatrice ?

Partie C

Dans cette partie on se propose d'étudier ma suite (u_n) à partir de la définition :

$$\text{pour tout entier naturel } n \text{ non nul, } u_n = \int_0^1 (1-t)^n e^t dt.$$

- 1) Montrer que pour tout entier naturel n non nul, $u_n \geq 0$.
- 2) a) Montrer que pour tout réel t de l'intervalle $[0; 1]$ et pour tout entier naturel non nul n

$$(1-t)^n e^t \leq e \times (1-t)^n.$$

b) En déduire que pour tout n non nul, $u_n \leq \frac{e}{n+1}$.

- 3) Déterminer la suite (u_n) .

Partie D

Dans cette partie, on se propose d'exploiter la relation de récurrence (R) vérifiée par la suite (u_n) .

$$u_{n+1} = (n+1)u_n - 1.$$

Etant donné un réel a , on considère la suite (v_n) définie par :

$$v_1 = a \text{ et pour tout entier naturel non nul } n, v_{n+1} = (n+1)v_n - 1.$$

- 1) En utilisant le raisonnement par récurrence, montrer que pour tout entier naturel non nul n , $v_n = u_n + (n!)(a + 2 - e)$ où $n!$ désigne le produit des n premiers entiers naturels non nuls.
- 2) Etudier le comportement de la suite (v_n) à l'infini suivant les valeurs de a . (On rappelle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n! = +\infty$.)
- 3) En déduire une raison susceptible d'expliquer les résultats affichés par les deux calculatrices.

EXERCICE 4 (5 points)

Candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité

1) On considère l'équation (E) :

$$109x - 226y = 1$$

où x et y sont des entiers relatifs.

a) Déterminer le pgcd de 109 et 226. Que peut-on en conclure pour l'équation (E) ?

b) Montrer que l'ensemble des solutions de (E) est l'ensemble des couples de la forme $(141 + 226k, 68 + 109k)$ où k appartient à \mathbb{Z} .

En déduire qu'il existe un unique entier naturel non nul d inférieur ou égal à 226 et un unique entier naturel non nul e tels que $109d = 1 + 226e$. (On précisera les valeurs des entiers d et e).

2) Démontrer que 227 est un nombre premier.

3) On note A l'ensemble des 227 entiers naturels a tels que $a \leq 226$.

On considère les deux fonctions f et g de A dans A définies de la manière suivante :

à tout entier de A , f associe le reste de la division euclidienne de a^{109} par 227.

à tout entier de A , g associe le reste de la division euclidienne de a^{141} par 227.

a) Vérifier que $g[f(0)] = 0$.

On rappelle le résultat suivant appelé petit théorème de Fermat :

Si p est un nombre premier et a un entier non divisible par p alors $a^{p-1} \equiv 1$ modulo p .

b) Montrer que, quel que soit l'entier non nul a de A , $a^{226} \equiv 1$ (modulo 227).

c) En utilisant 1b), en déduire que, quel que soit l'entier non nul a de A , $g[f(a)] = a$.

Que peut-on dire de $f[g(a)] = a$?