

**BACCALAUREAT GENERAL**

**MATHEMATIQUES**

**Série S**

**Enseignement Obligatoire**

*Durée de l'épreuve : 4 heures*

*Coefficient : 7*

Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1 à 6

Du papier millimétré est mis à la disposition des candidats.

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

*Le candidat doit traiter tous les exercices.  
La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour  
une part importante dans l'appréciation des copies.*

## EXERCICE 1 (5 points)

(Commun à tous les candidats)

Pour chacune des propositions suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse et donner une démonstration de la réponse choisie. Une réponse non démontrée ne rapporte aucun point. Toutefois, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative, même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ .

1. Soient  $A$  le point d'affixe  $2 - 5i$  et  $B$  le point d'affixe  $7 - 3i$ .

**Proposition 1 :** Le triangle  $OAB$  est rectangle isocèle.

2. Soit  $(\Delta)$  l'ensemble des points  $M$  d'affixe  $z$  telle que  $|z - i| = |z + 2i|$ .

**Proposition 2 :**  $(\Delta)$  est une droite parallèle à l'axe des réels.

3. Soit  $z = 3 + i\sqrt{3}$ .

**Proposition 3 :** Pour tout entier naturel  $n$  non nul,  $z^{3n}$  est imaginaire pur.

4. Soit  $z$  un nombre complexe non nul.

**Proposition 4 :** Si  $\frac{\pi}{2}$  est un argument de  $z$  alors  $|i + z| = 1 + |z|$ .

5. Soit  $z$  un nombre complexe non nul.

**Proposition 5 :** Si le module de  $z$  est égal à 1 alors  $z^2 + \frac{1}{z^2}$  est un nombre réel.

## EXERCICE 2 (5 points )

(Commun n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité)

Un joueur débute un jeu vidéo et effectue plusieurs parties successives.

On admet que :

- la probabilité qu'il gagne la première partie est de  $0,1$  ;
- s'il gagne une partie, la probabilité de gagner la suivante est égale à  $0,8$  ;
- s'il perd une partie, la probabilité de gagner la suivante est égale à  $0,6$ .

On note, pour tout entier naturel  $n$  non nul :

- $G_n$  l'événement « le joueur gagne la  $n$ -ième partie » ;
- $p_n$  la probabilité de l'événement  $G_n$ .

On a donc  $p_1 = 0,1$ .

1. Montrer que  $p_2 = 0,62$ . On pourra s'aider d'un arbre pondéré.
2. Le joueur a gagné la deuxième partie. Calculer la probabilité qu'il ait perdu la première.
3. Calculer la probabilité que le joueur gagne au moins une partie sur les trois premières parties.
4. Montrer que pour tout entier naturel  $n$  non nul,  $p_{n+1} = \frac{1}{5}p_n + \frac{3}{5}$ .
5. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel  $n$  non nul,  $p_n = \frac{3}{4} - \frac{13}{4} \left(\frac{1}{5}\right)^n$ .
6. Déterminer la limite de la suite  $(p_n)$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .
7. Pour quelles valeurs de l'entier naturel  $n$  a-t-on :  $\frac{3}{4} - p_n < 10^{-7}$  ?

### EXERCICE 3 (5 points )

(Commun à tous les candidats)

#### Partie A : Restitution organisée de connaissances

On supposera connus les résultats suivants :

- Soient  $u$  et  $v$  deux fonctions continues sur un intervalle  $[a; b]$ .

$$\text{Pour tous réels } \alpha \text{ et } \beta, \int_a^b [\alpha u(x) + \beta v(x)] dx = \alpha \int_a^b u(x) dx + \beta \int_a^b v(x) dx.$$

- Si  $u$  désigne une fonction continue sur un intervalle  $[a; b]$  et  $U$  une primitive de  $u$  sur  $[a; b]$

$$\text{alors } \int_a^b u(x) dx = [U(x)]_a^b = U(b) - U(a).$$

En utilisant la formule de dérivation d'un produit de deux fonctions dérivables, à dérivées continues sur un intervalle  $[a; b]$ , démontrer la formule d'intégration par parties.

#### Partie B

On considère la fonction  $f$  définie sur  $]0; +\infty[$  par

$$f(x) = x^2 \ln x.$$

La courbe  $(\mathcal{C})$  représentative de la fonction  $f$  dans le plan muni d'un repère orthonormal  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  est donnée en annexe.

- a. Déterminer la limite de  $f$  en  $+\infty$ .
  - b. Étudier les variations de  $f$  sur  $]0; +\infty[$ .
- Pour cette question, toute trace de recherche, même incomplète, sera prise en compte dans l'évaluation.*

Démontrer qu'il existe une tangente unique à la courbe  $(\mathcal{C})$  passant par  $O$ .  
Préciser une équation de cette tangente.
- On considère le solide obtenu par rotation autour de l'axe  $(Ox)$  de la région plane délimitée par la courbe  $(\mathcal{C})$ , l'axe  $(Ox)$  et les droites d'équations  $x = \frac{1}{e}$  et  $x = 1$ .  
On note  $V$  une mesure, exprimée en unités de volume, du volume de ce solide et on admet que :

$$V = \int_{\frac{1}{e}}^1 \pi [f(x)]^2 dx.$$

- a. Montrer qu'une primitive de la fonction  $x \mapsto x^4 \ln x$  sur  $]0; +\infty[$  est la fonction


$$x \mapsto \frac{x^5}{25} (5 \ln x - 1).$$

- b. En déduire, à l'aide d'une intégration par parties, que :  $V = \frac{\pi}{125} \left( 2 - \frac{37}{e^5} \right)$ .

### EXERCICE 4 (5 points )

(Commun à tous les candidats)

On considère le cube  $ABCDEFGH$  de côté 1 représenté ci-dessous.



Dans tout l'exercice, l'espace est rapporté au repère orthonormal  $(D, \overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DH})$ .  
On note  $K$  le barycentre des points pondérés  $(D, 1)$  et  $(F, 2)$ .

#### Partie A

1. Montrer que le point  $K$  a pour coordonnées  $\left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$ .
2. Montrer que les droites  $(EK)$  et  $(DF)$  sont orthogonales.
3. Calculer la distance  $EK$ .

#### Partie B

Soit  $M$  un point du segment  $[HG]$ .

On note  $m = HM$  ( $m$  est donc un réel appartenant à  $[0; 1]$ ).

1. Montrer que, pour tout réel  $m$  appartenant à l'intervalle  $[0; 1]$ , le volume du tétraèdre  $EMFD$ , en unités de volume, est égal à  $\frac{1}{6}$ .
2. Montrer qu'une équation cartésienne du plan  $(MFD)$  est  $(-1 + m)x + y - mz = 0$ .
3. On note  $d_m$  la distance du point  $E$  au plan  $(MFD)$ .
  - a. Montrer que, pour tout réel  $m$  appartenant à l'intervalle  $[0; 1]$ ,

$$d_m = \frac{1}{\sqrt{2m^2 - 2m + 2}}.$$

- b. Déterminer la position de  $M$  sur le segment  $[HG]$  pour laquelle la distance  $d_m$  est maximale.
- c. En déduire que lorsque la distance  $d_m$  est maximale, le point  $K$  est le projeté orthogonal de  $E$  sur le plan  $(MFD)$ .

# FEUILLE ANNEXE

## Exercice 3

Cette page ne sera pas à rendre avec la copie

