

BACCALAUREAT GENERAL

MATHEMATIQUES

Série S

Enseignement de Spécialité

Durée de l'épreuve : 4 heures

Coefficient : 9

Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1 à 6

Du papier millimétré est mis à la disposition des candidats.

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

*Le candidat doit traiter tous les exercices.
La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour
une part importante dans l'appréciation des copies.*

EXERCICE 1 (5 points)

(Commun à tous les candidats)

On considère une droite D munie d'un repère (O, \vec{i}) .

Soit (A_n) la suite de points de la droite D ainsi définie :

- A_0 est le point O ;
- A_1 est le point d'abscisse 1 ;
- pour tout entier naturel n , le point A_{n+2} est le milieu du segment $[A_n A_{n+1}]$.

1. a. Placer sur un dessin la droite D , les points $A_0, A_1, A_2, A_3, A_4, A_5$ et A_6 .
On prendra 10 cm comme unité graphique.

b. Pour tout entier naturel n , on note a_n l'abscisse du point A_n .

Calculer a_2, a_3, a_4, a_5 et a_6 .

c. Pour tout entier naturel n , justifier l'égalité : $a_{n+2} = \frac{a_{n+1} + a_n}{2}$.

2. Démontrer par récurrence, que pour tout entier n , $a_{n+1} = -\frac{1}{2}a_n + 1$.

3. Soit (v_n) la suite définie, pour tout entier naturel n , par $v_n = a_n - \frac{2}{3}$.

Démontrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $-\frac{1}{2}$.

4. Déterminer la limite de la suite (v_n) , puis celle de la suite (a_n) .

EXERCICE 2 (5 points)

(Commun ayant suivi l'enseignement de spécialité)

Les cinq questions sont indépendantes.

Pour chaque question, une affirmation est proposée. Indiquer si elle est vraie ou fausse, en justifiant la réponse. Une réponse qui n'est pas justifiée ne sera pas prise en compte.

Toute justification incomplète sera valorisée.

Question 1 On considère l'équation $(E) : 2x + 11y = 7$, où x et y sont des entiers relatifs.

Affirmation

Les seuls couples solutions de (E) sont les couples $(22k - 2; -4k + 1)$, avec k appartenant à l'ensemble \mathbb{Z} des entiers relatifs.

Question 2 On considère l'entier $N = 11^{2012}$.

Affirmation

L'entier N est congru à 4 modulo 7.

Question 3 On considère, dans le plan complexe, les points A , B et C d'affixes respectives :

$$a = 1 + i ; \quad b = 3i ; \quad c = (1 - 2\sqrt{2}) + i(1 - \sqrt{2}).$$

Affirmation

Le point C est l'image du point B par la similitude directe de centre A , de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $-\frac{\pi}{2}$.

Question 4 On considère, dans le plan complexe, les points A et B d'affixes respectives :

$$a = 1 + i ; \quad b = 2 - i.$$

Soit f la similitude d'écriture complexe : $z' = \left(-\frac{3}{5} - \frac{4}{5}i\right)\bar{z} + \left(\frac{12}{5} + \frac{6}{5}i\right)$.

Affirmation

La transformation f est la réflexion d'axe (AB) .

Question 5 L'espace est muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère la surface \mathcal{S} dont une équation est : $z = 4xy$.

Affirmation

La section de la surface \mathcal{S} par le plan d'équation $z = 0$ est la réunion de deux droites orthogonales.

EXERCICE 3 (5 points)


(Commun à tous les candidats)

La figure ci-contre représente un cube $ABCDEFGH$ d'arête 1.

On désigne par I et J les milieux respectifs des arêtes $[BC]$ et $[CD]$.

Soit M un point quelconque du segment $[CE]$.

Dans tout l'exercice, on se place dans le repère orthonormal $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.



1.
 - a. Donner, sans justification, les coordonnées des points C , E , I et J .
 - b. Justifier l'existence d'un réel t appartenant à l'intervalle $[0; 1]$, tel que les coordonnées du point M soient $(1 - t; 1 - t; t)$.
2.
 - a. Démontrer que les points C et E appartiennent au plan médiateur du segment $[IJ]$.
 - b. En déduire que le triangle MIJ est un triangle isocèle en M .
 - c. Exprimer IM^2 en fonction de t .
3. Le but de cette question est de déterminer la position du point M sur le segment $[CE]$ pour laquelle la mesure de l'angle \widehat{IMJ} est maximale.
On désigne par θ la mesure en radian de l'angle \widehat{IMJ} .
 - a. En admettant que la mesure θ appartient à l'intervalle $[0; \pi]$, démontrer que la mesure θ est maximale lorsque $\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$ est maximal.
 - b. En déduire que la mesure est maximale lorsque la longueur IM est minimale.
 - c. Étudier les variations de la fonction f définie sur l'intervalle $[0; 1]$ par :

$$f(t) = 3t^2 - t + \frac{1}{4}.$$

- d. En déduire qu'il existe une unique position M_0 du point M sur le segment $[EC]$ telle que la mesure de l'angle \widehat{IMJ} soit maximale.
- e. Démontrer que le point M_0 est le projeté orthogonal du point I sur le segment $[EC]$.

EXERCICE 4 (5 points)

(Commun à tous les candidats)

Soient f et g les fonctions définies sur l'ensemble \mathbb{R} des nombres réels par :

$$f(x) = xe^{1-x} \quad \text{et} \quad g(x) = x^2e^{1-x}.$$

Les courbes représentatives des fonctions f et g dans un repère orthogonal (O, \vec{i}, \vec{j}) sont respectivement notées \mathcal{C} et \mathcal{C}' . Leur tracé est donné en annexe.

1. Etude des fonctions f et g

- Déterminer les limites des fonctions f et g en $-\infty$.
- Justifier le fait que les fonctions f et g ont pour limite 0 en $+\infty$.
- Étudier le sens de variations de chacune des fonctions f et g et dresser leurs tableaux de variations respectifs.

2. Calcul d'intégrales

Pour tout entier naturel n , on définit l'intégrale I_n par :

$$I_0 = \int_0^1 e^{1-x} dx \quad \text{et, si } n \geq 1, I_n = \int_0^1 x^n e^{1-x} dx.$$

- Calculer la valeur exacte de I_0 .
- À l'aide d'une intégration par parties, démontrer que pour tout entier naturel n :

$$I_{n+1} = -1 + (n+1)I_n.$$

- En déduire la valeur exacte de I_1 , puis celle de I_2 .

3. Calcul d'une aire plane

- Étudier la position relative des courbes \mathcal{C} et \mathcal{C}' .
- On désigne par \mathcal{A} l'aire, exprimée en unité d'aire, de la partie du plan comprise d'une part entre les courbes \mathcal{C} et \mathcal{C}' , d'autre part entre les droites d'équations respectives $x = 0$ et $x = 1$. En exprimant \mathcal{A} comme différence de deux aires que l'on précisera, démontrer l'égalité :

$$\mathcal{A} = 3 - e.$$

4. Etude de l'égalité de deux aires

Soit a un réel strictement supérieur à 1.

On désigne par $S(a)$ l'aire, exprimée en unité d'aire, de la partie du plan comprise d'une part entre les courbes \mathcal{C} et \mathcal{C}' , d'autre part entre les droites d'équations respectives $x = 1$ et $x = a$.

On admet que $S(a)$ s'exprime par :

$$S(a) = 3 - e^{1-a}(a^2 + a + 1).$$

L'objectif de cette question est de prouver qu'il existe une et une seule valeur de a pour laquelle les aires \mathcal{A} et $S(a)$ sont égales.

- Démontrer que l'équation $S(a) = \mathcal{A}$ est équivalente à l'équation :

$$e^a = a^2 + a + 1.$$

- Dans cette question, toute trace d'argumentation, même incomplète, ou d'initiative, même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.

Conclure, quant à l'existence et l'unicité du réel a , solution du problème posé.

FEUILLE ANNEXE

Courbes de l'exercice 4

