

Polynésie 2013. Enseignement spécifique

EXERCICE 1 (6 points) (commun à tous les candidats)

On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = (x + 2)e^{-x}$.

On note \mathcal{C} la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal.

1) Étude de la fonction f .

- Déterminer les coordonnées des points d'intersection de la courbe \mathcal{C} avec les axes du repère.
- Étudier les limites de la fonction f en $-\infty$ et en $+\infty$. En déduire les éventuelles asymptotes à la courbe \mathcal{C} .
- Étudier les variations de la fonction f sur \mathbb{R} .

2) Calcul d'une valeur approchée de l'aire sous une courbe.


On note \mathcal{D} le domaine compris entre l'axe des abscisses, la courbe \mathcal{C} et les droites d'équation $x = 0$ et $x = 1$.

On approche l'aire du domaine \mathcal{D} en calculant une somme d'aires de rectangles.

a) Dans cette question, on découpe l'intervalle $[0, 1]$ en quatre intervalles de même longueur :

- sur l'intervalle $\left[0, \frac{1}{4}\right]$, on construit un rectangle de hauteur $f(0)$
- sur l'intervalle $\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$, on construit un rectangle de hauteur $f\left(\frac{1}{4}\right)$
- sur l'intervalle $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$, on construit un rectangle de hauteur $f\left(\frac{1}{2}\right)$
- sur l'intervalle $\left[\frac{3}{4}, 1\right]$, on construit un rectangle de hauteur $f\left(\frac{3}{4}\right)$

Cette construction est illustrée ci-dessous.



L'algorithme ci-dessous permet d'obtenir une valeur approchée de l'aire du domaine \mathcal{D} en ajoutant les aires des quatre rectangles précédents :

Variables :	k est un nombre entier S est un nombre réel
Initialisation :	Affecter à S la valeur 0
Traitement :	Pour k variant de 0 à 3 Affecter à S la valeur $S + \frac{1}{4}f\left(\frac{k}{4}\right)$ Fin Pour
Sortie :	Afficher S

Donner une valeur approchée à 10^{-3} près du résultat affiché par cet algorithme.

- b) Dans cette question, N est un nombre entier strictement supérieur à 1. On découpe l'intervalle $[0, 1]$ en N intervalles de même longueur. Sur chacun de ces intervalles, on construit un rectangle en procédant de la même manière qu'à la question 2)a). Modifier l'algorithme précédent afin qu'il affiche en sortie la somme des aires des N rectangles ainsi construits.

3) Calcul de la valeur exacte de l'aire sous une courbe.

Soit g la fonction définie sur \mathbb{R} par $g(x) = (-x - 3)e^{-x}$. On admet que la fonction g est une primitive de la fonction f sur \mathbb{R} .

- a) Calculer l'aire exacte \mathcal{A} du domaine \mathcal{D} , exprimée en unités d'aire.
- b) Donner une valeur approchée à 10^{-3} près de l'erreur commise en remplaçant \mathcal{A} par la valeur approchée trouvée au moyen de l'algorithme à la question 2)a), c'est-à-dire de l'écart entre ces deux valeurs.