

**CONCOURS ENSAM - ESTP - ECRIN - ARCHIMEDE****Epreuve de Mathématiques B MP****durée 3 heures**

L'usage de la calculatrice est interdit**Exercice 1**

1. Soit E un espace vectoriel sur le corps \mathbb{C} de dimension finie $n > 0$. Soit u un endomorphisme de E de rang 1.
 - (i) En discutant sur la dimension de $\text{Im}u \cap \text{Ker}u$, montrer que $E = \text{Im}u \oplus \text{Ker}u$ ou $\text{Im}u \subset \text{Ker}u$.
 - (ii) Soit e un vecteur non nul de $\text{Im}u$. Justifier l'existence d'une base de E dont le premier vecteur est e . Dans le cas où $\text{Im}u \subset \text{Ker}u$, quelle est la forme de la matrice de u sur une telle base?
 - (ii) Dans le cas où $\text{Im}u \subset \text{Ker}u$, montrer que $\text{Tr}(u) = 0$.
 - (iii) Montrer alors l'équivalences des trois assertions :
 - (a) u est diagonalisable.
 - (b) $E = \text{Im}u \oplus \text{Ker}u$.
 - (c) $\text{Tr}(u) \neq 0$.

On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ le \mathbb{C} -espace vectoriel des matrices (n, n) à coefficients dans \mathbb{C} . On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})^*$ le dual de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, c'est à dire l'espace vectoriel des formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

2. Soit A dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On note F_A l'application définie sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ par :

$$\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), F_A(X) = \text{Tr}(AX),$$

où $\text{Tr}(AX)$ désigne la trace de la matrice AX .

(i) Montrer que F_A est une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(ii) On considère l'application F définie par :

$$F : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^* \\ A \mapsto F_A$$

Montrer que F est linéaire.

(iii) Soit $(E_{i,j})_{(i,j) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, n\}}$ la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (on rappelle que la matrice $E_{i,j}$ est la matrice dont tous les coefficients sont nuls, excepté le (i, j) -ième qui est égal à 1). Pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, n\}$, exprimer $F_A(E_{i,j})$ en fonction des coefficients de A . En déduire que F est injective.

(iv) Montrer que F est un isomorphisme.

3. Soit J une matrice non nulle de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et soit f une forme linéaire non nulle sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On considère l'application ψ_f définie par :

$$\psi_f : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ X \mapsto f(X)J$$

On remarquera que ψ_f est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(i) Justifier l'existence d'une unique matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que :

$$\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), f(X) = \text{Tr}(AX).$$

(ii) Comparer le noyau de ψ_f et le noyau de f . Quel est l'image de ψ_f ? Quel est le rang de ψ_f ?

(iii) Exprimer la trace de ψ_f en fonction de A et J .

(iv) En déduire une condition nécessaire et suffisante portant sur A et J pour que ψ_f soit diagonalisable.

(v) On suppose que ψ_f est diagonalisable. Déterminer le polynôme minimal de ψ_f .

Exercice 2

1. On considère la fonction f définie par :

$$f : \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \ln(\cos x) .$$

(i). Calculer la limite quand x tend vers 0 de :

$$\frac{1}{x^2} f(x).$$

(ii). En déduire qu'il existe des réels strictement positifs α , C et C' telle que :

$$\forall x \in]-\alpha, \alpha[, -Cx^2 \leq \ln(\cos x) \leq -C'x^2.$$

(iii). Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de nombres réels telle que la série de terme général $(u_n)^2$ converge.

a. Montrer qu'il existe un entier naturel n_0 tel que :

$$\forall n \geq n_0, \cos u_n > 0.$$

b. Montrer que la série $\sum_{n \geq n_0} \ln(\cos u_n)$ converge.

2. Soit β un réel dans l'intervalle $]0, \frac{\pi}{2}[$. Pour tout entier naturel $n \geq 0$, on pose $P_n = \prod_{i=0}^n \cos(\beta/2^i)$. On note \mathbf{P}_β la suite $(P_n)_{n \geq 0}$.

(i) Montrer que la suite \mathbf{P}_β est une suite décroissante positive. En déduire qu'elle admet une limite $l_\beta \geq 0$.

(ii) Montrer en utilisant les résultats de la question 1. que $l_\beta \neq 0$.

3. Dans cette question on considère le corps de nombres complexes \mathbb{C} comme un plan affine. Chaque point est caractérisé par son affixe. Soit O le point d'affixe 0. Soit Ω le cercle de centre O et de rayon 1. Pour tout entier naturel n , on pose $\theta_n = \frac{2\pi}{2^{n+2}}$ et on considère le polygone régulier Π_n inscrit dans Ω défini par ses 2^{n+2} sommets :

$$1, e^{i\theta_n}, \dots, e^{ik\theta_n}, \dots, e^{i(2^{n+2}-1)\theta_n}$$

(i) Représenter sur une même figure Π_0 et Π_1 .

(ii) Soit A le point d'affixe 1. Soit θ dans $]0, \frac{\pi}{2}[$; soient B le point d'affixe $e^{i\theta}$ et C le point d'affixe $e^{2i\theta}$. On note M le milieu de AC .

a. Montrer que l'aire du triangle OAC vérifie la relation :

$$\text{aire}(OAC) = OM.MA = \sin \theta \cos \theta.$$

b. En déduire que les aires respectives des triangles OAC et OAB vérifient la relation :

$$\text{aire}(OAC) = 2 \cos \theta \text{aire}(OAB).$$

- (iii) Soit n un entier naturel. On note B_n le point d'affixe $e^{i\theta_n}$. Exprimer l'aire du polygone Π_n en fonction de l'aire du triangle OAB_n .
- (iv) En utilisant les résultats des questions (ii) et (iii), montrer que :

$$\text{aire}(\Pi_n) = \cos\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right)\text{aire}(\Pi_{n+1}).$$

- (v) En admettant que lorsque n tend vers $+\infty$, l'aire de Π_n tend vers l'aire de Ω , montrer que :

$$l_{\frac{\pi}{4}} = \frac{2}{\pi},$$

$l_{\frac{\pi}{4}}$ désignant la limite de la suite $\mathbf{P}_{\frac{\pi}{4}}$ définie dans la question 2.

Exercice 3

On considère le plan affine euclidien \mathbb{R}^2 rapporté au repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) . Soit a un réel strictement positif. Soit I le point de coordonnées $(a, 0)$. On considère \mathcal{C} le cercle de centre I passant par O .

1. Soit M un point du plan distinct de O . On note (α, β) les coordonnées de M .
 - a) Ecrire en fonction de α et β , l'équation de la droite (D_M) passant par M et orthogonale au vecteur \overrightarrow{OM} .
 - b) Calculer en fonction de a , α et β le carré de la distance du point I à la droite (D_M) .
 - c) Trouver une relation entre α et β nécessaire et suffisante pour que (D_M) soit tangente au cercle \mathcal{C} .

On note (Γ) l'ensemble des projections orthogonales de O sur les tangentes au cercle \mathcal{C} .

2. En déduire une équation cartésienne de (Γ) . Montrer que (Γ) admet une équation polaire de la forme $r = a(1 + \cos(\theta))$.
3. Construire (Γ) dans le repère Oxy en prenant $a = 2\text{cm}$.
4. On note $(\Gamma_{2\pi/3})$ la courbe déduite de (Γ) par la rotation affine de centre O et d'angle $2\pi/3$.
 - a) Tracer $(\Gamma_{2\pi/3})$ sur le même graphique que (Γ) .
 - b) Calculer, en fonction de a , l'aire de la portion de plan intérieure aux courbes (Γ) et $(\Gamma_{2\pi/3})$.