

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES,
ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES DE L'AÉRONAUTIQUE ET DE L'ESPACE,
DE TECHNIQUES AVANCÉES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS,
DES MINES DE PARIS, DES MINES DE SAINT-ÉTIENNE, DES MINES DE NANCY, DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS DE BRETAGNE,
ÉCOLE POLYTECHNIQUE (FILIÈRE TSI).

CONCOURS D'ADMISSION 2000

MATHÉMATIQUES

PREMIÈRE ÉPREUVE

FILIÈRE PSI

(Durée de l'épreuve : 3 heures)

Sujet mis à la disposition des concours : ENSTIM, INT, TPE-EIVP.

L'emploi de la calculatrice est interdit.

Les candidats sont priés de mentionner de façon très apparente sur la première page de la copie : MATHÉMATIQUES I - PSI.

L'énoncé de cette épreuve, particulière aux candidats de la filière PSI, comporte 4 pages.

Si un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Le but de ce problème est l'étude d'endomorphismes définis par l'action d'un groupe sur un espace vectoriel de matrices complexes.

Soit M l'ensemble des matrices complexes m d'ordre 2 qui s'écrivent sous la forme suivante :

$$m = \begin{pmatrix} a & i b \\ i \bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix}.$$

Dans cette relation, a et b sont des nombres complexes, i vérifie $i^2 = -1$, \bar{a} (resp. \bar{b}) est le nombre complexe conjugué de a (resp. b).

Partie préliminaire

0. L'ensemble M est un espace vectoriel réel :

Démontrer qu'en munissant l'ensemble M de l'addition des matrices et de la multiplication des matrices par un réel, l'ensemble M est un espace vectoriel réel. Préciser sa dimension.

Démontrer que le produit de deux matrices m_1 et m_2 de l'espace M appartient à M .

Soit I la matrice unité d'ordre 2. Soit m une matrice appartenant à l'espace vectoriel M ; la matrice transposée de la matrice m est notée ${}^t m$. Si p est un entier naturel, m^p est le produit de la matrice m p -fois par elle-même ; classiquement $m^0 = I$.

Soit G le sous-ensemble des matrices g appartenant à l'espace M dont le déterminant est égal à 1 :

$$G = \{g \in M \mid \det g = 1\}.$$

Il est admis que l'ensemble G est, pour le produit des matrices, un groupe.

Soit U le sous-ensemble des matrices u de l'espace M antisymétriques dont le carré est égal à l'opposé de la matrice identité :

$$U = \{u \in M \mid u + {}^t u = 0, u^2 = -I\}.$$

Soit V le sous-ensemble des matrices symétriques v appartenant à l'espace M :

$$V = \{v \in M \mid v = {}^t v\}.$$

Il est admis que le sous-ensemble V de M est un sous-espace vectoriel réel.

Soient m_1 et m_2 deux matrices appartenant à l'espace vectoriel M ; il est admis que la trace de la matrice $\bar{m}_1 \cdot {}^t m_2$ est réelle ; soit $(m_1 \mid m_2)$ le réel défini par la relation suivante :

$$(m_1 \mid m_2) = \frac{1}{2} \text{Tr}(\bar{m}_1 \cdot {}^t m_2) = \frac{1}{2} \text{Tr}(m_1 \cdot {}^t \bar{m}_2).$$

L'égalité entre les traces des matrices $\bar{m}_1 \cdot {}^t m_2$ et $m_1 \cdot {}^t \bar{m}_2$ est admise.

Il est admis que l'espace $(M, (\cdot \mid \cdot))$ est un espace euclidien. Si le produit scalaire $(m_1 \mid m_2)$, de deux matrices m_1 et m_2 , est nul, ces matrices sont dites perpendiculaires. Le sous-espace vectoriel V de M est un espace euclidien lorsqu'il est muni du produit scalaire induit par celui de M .

Première partie

I.1. Propriétés élémentaires des matrices de l'espace M :

Soit m une matrice de l'espace M ; démontrer que les matrices $m + {}^t \bar{m}$ et $m \cdot {}^t \bar{m}$ s'expriment au moyen de la matrice identité I , du déterminant $\det m$, de la trace $\text{Tr} m$ de la matrice m .

Soit g une matrice appartenant à M ; déduire du résultat précédent que, pour qu'une matrice g de l'espace M appartienne au groupe G , il faut et il suffit qu'il existe une relation simple entre les matrices g^{-1} et ${}^t \bar{g}$.

Soit m une matrice de l'espace M dont la trace est nulle ($\text{Tr} m = 0$) ; établir la relation : $m = -{}^t \bar{m}$; calculer les matrices m^2 , $({}^t m)^2$ en fonction du déterminant de la matrice m et de la matrice unité I .

I.2 Matrices u :

Déterminer les matrices u qui appartiennent à l'ensemble U défini ci-dessus.

Soit m une matrice de l'espace M , u une matrice de l'ensemble U . Comparer les deux produits de matrices : $m \cdot u$ et $u \cdot \bar{m}$. Démontrer que, lorsque la trace de la matrice m est nulle ($\text{Tr} m = 0$), les deux matrices $m \cdot u$ et $u \cdot m$ appartiennent au sous-espace vectoriel V .

I.3. Norme d'une matrice m :

Soit m une matrice de l'espace M ; calculer la norme de la matrice m ($\| m \| = \sqrt{(m \mid m)}$) en fonction du déterminant de cette matrice. Comparer pour deux matrices m et w de l'espace M la norme $\| m \cdot w \|$ du produit des matrices m et w avec le produit $\| m \| \cdot \| w \|$ des normes de ces matrices.

I.4. Matrices appartenant à G :

a. Démontrer que toute matrice g appartenant au groupe G s'écrit, de manière unique, sous la forme

$$g = I \cos \theta + m,$$

où θ est un réel appartenant au segment $[0, \pi]$ et m une matrice de trace nulle ($\text{Tr} m = 0$) qui appartient à M .

Calculer, en fonction du réel θ , le déterminant de la matrice m , ainsi définie à partir de la matrice g , ainsi que le carré m^2 de la matrice m .

b. Soit m une matrice de l'espace M différente de 0 ($m \neq 0$) : démontrer que la matrice g_1 définie par la relation ci-dessous appartient au groupe G :

$$g_1 = \frac{1}{\sqrt{\det m}} m.$$

I-5 Un sous-groupe de G :

Soit g_1 une matrice de trace nulle ($\text{Tr} g_1 = 0$) appartenant à G ; soit $G(g_1)$ l'ensemble des matrices m_θ définies par la relation suivante

$$m_\theta = I \cos \theta + g_1 \sin \theta,$$

où θ un réel quelconque appartenant au segment $[0, 2\pi]$; soit :

$$G(g_1) = \{m_\theta = I \cos \theta + g_1 \sin \theta \mid \theta \in [0, 2\pi]\}.$$

Démontrer que l'ensemble $G(g_1)$ est un sous-groupe commutatif du groupe G .

Deuxième partie

Cette partie est consacrée à l'étude d'une application définie dans le sous-espace vectoriel V des matrices symétriques de M à l'aide d'une matrice du groupe G .

Dans toute cette partie, g est une matrice donnée du groupe G , de trace nulle ($\text{Tr} g = 0$) ; étant donnée une matrice w appartenant au sous-espace vectoriel V soit $l_g(w)$ la matrice définie par la relation suivante :

$$l_g(w) = g.w + w.^t g.$$

II-1. L'endomorphisme l_g de V :

a. Déterminer la dimension du sous-espace vectoriel réel V de l'espace vectoriel M . Déterminer une base de ce sous-espace vectoriel.

b. Démontrer que l'application $l_g : w \mapsto l_g(w)$ est un endomorphisme de l'espace vectoriel V . Démontrer que cet endomorphisme l_g n'est pas nul.

II-2. Propriétés de l'endomorphisme l_g :

a. Comparer l'endomorphisme $l_g \circ l_g : w \mapsto l_g(l_g(w))$ à l'endomorphisme $w \mapsto 2g.l_g(w)$. Calculer l'expression $l_g(g.l_g(w))$ en fonction de $l_g(w)$.

Comparer les deux normes $\| l_g(w) \|$ et $\| g.l_g(w) \|$.

Calculer, pour une matrice u de l'ensemble U , l'expression $l_g(g.u)$.

b. Déterminer une relation simple qui lie, pour deux matrices quelconques v et w de l'espace V , les produits scalaires $(l_g(v) \mid w)$ et $(v \mid l_g(w))$.

En déduire l'endomorphisme adjoint de l'endomorphisme l_g .

c. Dédurre des résultats précédents, que, pour toute matrice w de V , les matrices $l_g(w)$ et $g.l_g(w)$ sont perpendiculaires.

II-3. Une base de l'espace V :

Etant données une matrice v de l'espace vectoriel V telle que son image par l'endomorphisme l_g soit différente de 0 ($l_g(v) \neq 0$), une matrice u de l'ensemble U (u appartient à M , est antisymétrique, $u^2 = -I$), soient h_0 le produit des matrices g et u , h_1 l'image de la matrice v par l'application l_g , h_2 le produit des matrices g et h_1 :

$$h_0 = g.u, h_1 = l_g(v), h_2 = g.l_g(v).$$

a. Calculer les produits scalaires de la matrice u avec chacune des matrices $h_i, 0 \leq i \leq 2$, et des matrices $h_i, 0 \leq i \leq 2$, deux à deux :

$$(u | h_i), 0 \leq i \leq 2, (h_k | h_l), 0 \leq k \leq l \leq 2.$$

b. Démontrer que la suite des matrices $h_i, 0 \leq i \leq 2$, est une base de l'espace vectoriel V . Dédurre de cette base une base orthonormée. Quelle est la matrice associée à l'endomorphisme l_g dans cette base ? Déterminer la transformation géométrique associée à l'endomorphisme $\frac{1}{2}l_g$.

II-4. Un endomorphisme de l'espace vectoriel M :

Soit θ un réel donné appartenant au segment $[0, 2\pi]$; soit m_θ la matrice appartenant au groupe G (question I-5) définie par la relation suivante :

$$m_\theta = I \cos \theta + g \sin \theta.$$

Soit s_θ l'application qui, à une matrice w de l'espace vectoriel M , associe la matrice $m_\theta.w$.

$$s_\theta : w \mapsto m_\theta.w.$$

Déterminer la matrice associée à l'endomorphisme s_θ dans la base définie par les matrices u, h_0, h_1, h_2 .

FIN DU PROBLEME